



HOSPITAL DE
CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS

EDITAL Nº 03/2021
DE PROCESSOS SELETIVOS (PS)

MISSÃO

Ser um referencial público em saúde, prestando assistência de excelência, gerando conhecimento, formando e agregando pessoas de alta qualificação.

PS 18 - MÉDICO I
(Hebiatra do Serviço de Pediatria)

MATÉRIA	QUESTÕES	PONTUAÇÃO
Conhecimentos Específicos	01 a 25	0,40 cada

ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTAS, com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

Deus ajuda a quem cedo madruga.



DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA FAURGS E DO HCPA.

Nome do Candidato: _____

Inscrição nº: _____

INSTRUÇÕES

- 1 Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de **25** (vinte e cinco) questões objetivas.
- 3 Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 5 Os candidatos que comparecerem para realizar a prova **não deverão portar** armas, malas, livros, máquinas calculadoras, fones de ouvido, gravadores, *paggers*, *notebooks*, **telefones celulares**, *pen drives* ou quaisquer aparelhos eletrônicos similares, nem utilizar véus, bonés, chapéus, gorros, mantas, lenços, aparelhos auriculares, próteses auditivas, óculos escuros, ou qualquer outro adereço que lhes cubra a cabeça, o pescoço, os olhos, os ouvidos ou parte do rosto, exceto em situações previamente autorizadas pela Comissão do Concurso e/ou em situações determinadas em lei (como o caso presente do uso obrigatório de máscara, em virtude da pandemia do Coronavírus). **Os relógios de pulso serão permitidos, desde que permaneçam sobre a mesa, à vista dos fiscais, até a conclusão da prova.** (conforme subitem 7.10 do Edital de Abertura)
- 6 **É de inteira responsabilidade do candidato comparecer ao local de prova munido de caneta esferográfica, preferencialmente de tinta azul, de escrita grossa, para a adequada realização de sua Prova Escrita. Não será permitido o uso de lápis, marca-textos, régua, lapiseiras/grafites e/ou borrachas durante a realização da prova.** (conforme subitem 7.15.2 do Edital de Abertura)
- 7 Não será permitida nenhuma espécie de consulta em livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem o uso de instrumentos de cálculo ou outros instrumentos eletrônicos, exceto nos casos em que forem pré-estabelecidos no item 13 do Edital. (conforme subitem 7.15.3 do Edital de Abertura)
- 8 Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA a partir do número **26** serão desconsideradas.
- 9 Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 10 A duração da prova é de **duas horas e trinta minutos (2h30min)**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 11 **O candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora (1h) após o seu início. Se quiser levar o Caderno de Questões da Prova Escrita, o candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora e meia (1h30min) após o início. O candidato não poderá anotar/copiar o gabarito de suas respostas de prova.**
- 12 **Após concluir a prova e se retirar da sala, o candidato somente poderá se utilizar de sanitários nas dependências do local de prova se for autorizado pela Coordenação do Prédio e se estiver acompanhado de um fiscal.** (conforme subitem 7.15.6 do Edital de Abertura)
- 13 Ao concluir a Prova Escrita, o candidato deverá devolver ao fiscal da sala a Folha de Respostas (Folha Óptica). Se assim não proceder, será excluído do Processo Seletivo. (conforme subitem 7.15.8 do Edital de Abertura)
- 14 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

01. Assinale a afirmação correta em relação à consulta do adolescente.

- (A) O acolhimento do adolescente por toda a equipe de saúde é importante e deve seguir certos protocolos mínimos, tais como não atendê-lo se estiver desacompanhado ou sem os documentos exigidos.
- (B) O uso de novas estratégias de comunicação, incluindo acesso por *smartphones* e redes sociais, está contraindicado na prática clínica por questões de segurança, ainda que haja evidências de que pode ter impacto positivo no cuidado da saúde de jovens.
- (C) Na consulta do adolescente, é indispensável estabelecer um senso de confidencialidade, assegurando o aspecto sigiloso da consulta, mas deve ficar claro que o sigilo será quebrado em situações graves (por exemplo, risco de vida para o paciente ou terceiros), presença de ideias suicidas, violência física contra outras pessoas e risco de abuso sexual.
- (D) A confiabilidade dos métodos de avaliação do perfil psicossocial do adolescente baseados em acrônimos como AADDOLESSE ou HEEADSSS depende de que todas as perguntas de cada tópico sejam feitas na ordem em que foram validadas no método em questão.
- (E) O exame físico completo deve ser realizado em todas as consultas de adolescentes, pois há evidências convincentes de que a ênfase dada a esse procedimento de forma sequencial fortalece a relação médico-paciente.

02. Conforme o Marco Legal Nacional relacionado à saúde do adolescente, referente à Lei de Estupro de Vulnerável (Súmula 593 do STJ, publicada em 26/10/2017), considere as situações nos itens abaixo.

- I - Possibilidade de sexo consentido e sem evidência de violência ou grave ameaça.
- II - Vítima sexualmente ativa previamente.
- III- Envolvimento amoroso, no qual vítima e autor são namorados.

Diante de gravidez ou relação sexual com menores de 14 anos, em quais situações a notificação é obrigatória?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

03. Assinale a afirmação correta em relação à violência doméstica contra o adolescente.

- (A) A triagem e a orientação preventiva da violência doméstica constam em todos os protocolos de atenção à saúde do adolescente como recomendação de procedimento anual prioritário, a partir dos doze anos, em vista de seu benefício definido por evidências científicas.
- (B) Diversos estudos demonstram a existência de um ciclo de perpetuação intergeracional da violência doméstica, de modo que trabalhar com vítimas de violência na infância deve ter precedência sobre programas para o aprimoramento da paternidade/maternidade e melhoria da qualidade de vida familiar.
- (C) A percepção de que um adolescente exiba uma conduta de desconfiança exagerada em relação aos adultos, medo dos pais e tentativa de passar o mínimo de tempo em casa constitui indício de violência domiciliar, para o qual todo profissional de saúde precisa estar atento.
- (D) Toda fratura óssea, independentemente da circunstância do evento traumático, deve ser considerada um indício orgânico de violência doméstica, com base na epidemiologia desse tipo de agravo físico.
- (E) Cabe ao profissional de saúde conhecer e cumprir a disposição do Estatuto da Criança e do Adolescente sobre a obrigatoriedade de se denunciar ao conselho tutelar apenas os casos confirmados de maus-tratos contra criança ou adolescente.

04. Na promoção da saúde do adolescente, todos os seguintes procedimentos de triagem são considerados prioritários, por terem benefício líquido moderado a substancial, **EXCETO**:

- (A) teste de acuidade visual aos onze anos.
- (B) triagem para violência doméstica.
- (C) teste de triagem para clamídia, realizado anualmente, em meninas sexualmente ativas.
- (D) triagem universal para HIV, uma vez, a partir dos quinze anos.
- (E) triagem de uso de tabaco e/ou exposição ambiental ao tabaco.

05. Assinale a afirmação correta em relação à segurança do adolescente no trânsito.

- (A) Os traumas no trânsito estão entre as primeiras causas de morte entre adolescentes, mas não de anos de vida perdidos ajustados para deficiência.
- (B) Para a segurança dos passageiros de veículos automotores, recomenda-se o uso de assentos de elevação até que atinjam a estatura de um metro, independentemente da idade.
- (C) A estatura mínima para o uso do cinto de segurança padrão é 1,45m, desde que o adolescente tenha mais de doze anos.
- (D) O cinto de segurança de adulto pode ser usado por qualquer adolescente, já que está liberado a partir dos sete anos e meio de idade.
- (E) Segundo consenso de especialistas, adolescentes devem viajar no banco traseiro até os treze anos de idade.

06. Adolescente de 15 anos de idade comparece sozinho à consulta médica, na qual solicita testagem de HIV realizada em sigilo. Assinale a alternativa que **NÃO** apresenta um dos procedimentos que devem ser realizados antes dessa testagem de HIV.

- (A) Avaliar a maturidade psicológica e compreensão do adolescente.
- (B) Avaliar a motivação do adolescente para solicitar a referida testagem.
- (C) Avaliar a capacidade do adolescente de adesão a possível tratamento farmacológico.
- (D) Informar o adolescente que deve compartilhar a informação com responsável legal.
- (E) Informar o adolescente sobre os riscos de transmissão de HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis.

07. Sobre desenvolvimento puberal e estágios de Tanner no sexo feminino, assinale a afirmativa correta.

- (A) O pico de estirão puberal ocorre no estágio 4, caracterizado pela presença de mama maior e com mais elevação, estendendo-se além do parâmetro areolar; a aréola continua a aumentar, mas permanece no mesmo plano que a mama.
- (B) O início do estirão puberal ocorre no estágio 2, caracterizado pela presença de tecido mamário com elevação, estendendo-se além do parâmetro areolar.
- (C) A menarca ocorre geralmente próximo ao estágio 4, que se caracteriza pelo aumento e pela projeção da aréola e da papila, formando-se uma segunda saliência acima do nível da mama.
- (D) A parada do crescimento estatural ocorre no estágio 5, caracterizado por pelos que se assemelham aos pelos de adulto em volume, espessura e ondulação, mas sem se estender até a superfície medial das coxas.
- (E) No estágio 4, os pelos pubianos estão em quantidade moderada, mais encaracolados, pigmentados e mais grossos, estendendo-se mais lateralmente além dos grandes lábios vaginais.

08. Sobre desenvolvimento puberal e estágios de Tanner no sexo masculino, assinale a afirmativa correta.

- (A) O primeiro sinal físico da puberdade ocorre em média aos 10 anos, equivalendo ao estágio 2, caracterizado por testículos maiores que 4mL.
- (B) O início do estirão puberal ocorre no estágio 3, caracterizado pela presença do aumento da bolsa escrotal, com pele mais fina e avermelhada, e pequena quantidade de pelos longos, ligeiramente pigmentados ao longo da base do escroto e do pênis.
- (C) A semenarca ocorre no estágio 3, em que se observam pelos pubianos em quantidade moderada, mais encaracolados, pigmentados e mais grossos, estendendo-se mais lateralmente além da sínfise pubiana.
- (D) O pico de estirão masculino ocorre no estágio 4, em que se observa um crescimento peniano em comprimento.
- (E) A parada do crescimento ocorre após atingir o estágio 5, caracterizado por bolsa escrotal, pênis e pelos pubianos que se assemelham aos de adulto, mas sem os pelos atingirem a superfície medial das coxas.

09. Durante a puberdade, os adolescentes crescem um total de _____. A velocidade máxima de crescimento em altura ocorre, em média, entre _____ no sexo masculino e _____ no sexo feminino. Atingida a velocidade máxima de crescimento, segue-se uma gradual desaceleração até a parada de crescimento, com duração em torno de _____.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas da frase acima.

- (A) 15 a 35 cm – 14 e 15 anos – 11 e 12 anos – 2 a 3 anos
- (B) 10 a 30 cm – 12 e 13 anos – 12 e 13 anos – 2 a 3 anos
- (C) 15 a 35 cm – 13 e 14 anos – 12 e 13 anos – 3 a 4 anos
- (D) 10 a 30 cm – 13 e 14 anos – 11 e 12 anos – 3 a 4 anos
- (E) 8 a 25 cm – 14 e 15 anos – 13 e 14 anos – 2 a 3 anos

10. No sexo feminino, é considerado puberdade precoce qualquer sinal de maturação sexual antes dos _____ de idade, e puberdade tardia considera-se quando a telarca e pubarca ocorrem em idades superiores a _____, respectivamente, e a menarca em idades superiores a _____.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas da frase acima.

- (A) 9 anos – 13 e 14 anos – 15 anos
- (B) 8 anos – 13 e 14 anos – 16 anos
- (C) 9 anos – 14 e 15 anos – 14 anos
- (D) 8 anos – 12 e 13 anos – 15 anos
- (E) 9 anos – 13 e 14 anos – 16 anos

11. Considere o texto abaixo sobre ginecomastia no sexo masculino durante a adolescência.

Aproximadamente metade dos casos de ginecomastia em meninos ocorre no estágio de Tanner _____, sendo que a maioria apresenta localização _____. Em _____, o tamanho da glândula mamária ultrapassa 4 cm de diâmetro. Em adolescentes que apresentam glândula mamária de diâmetro igual ou _____ que a área subareolar, sem história de uso de medicamentos ou patologias associados à ginecomastia, o diagnóstico mais provável é ginecomastia puberal.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do texto acima.

- (A) 3 – bilateral – menos de 5% – menor
- (B) 4 – unilateral – menos de 5% – menor
- (C) 3 – unilateral – mais de 10% – maior
- (D) 4 – bilateral – mais de 10% – maior
- (E) 3 – unilateral – menos de 5% – menor

12. Em relação à dismenorrea durante a adolescência, qual assertiva **NÃO** está correta?

- (A) Embora esteja associada a ciclos ovulatórios, a dismenorrea também pode ocorrer relacionada aos primeiros ciclos menstruais.
- (B) A dismenorrea secundária ocorre em casos relacionados a doenças ginecológicas como endometriose, doença inflamatória pélvica, entre outras.
- (C) A ação das prostaglandinas na dismenorrea causa aumento da viscosidade e descamação do endométrio.
- (D) A indicação de anticoncepção hormonal oral tem como objetivo diminuição da síntese de prostaglandinas.
- (E) Entre as causas de dismenorrea primária, devem-se considerar fatores psicogênicos.

13. Assinale as assertivas abaixo, sobre vantagens de uso de anticoncepcional injetável trimestral (acetato de medroxiprogesterona) em meninas adolescentes, com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () Há ocorrência de amenorrea, podendo-se inclusive prevenir anemia por deficiência de ferro.
- () O retorno da fertilidade ocorre 2-3 meses após interrupção do método.
- () Há menor risco de crises falciformes em indivíduos com doença falciforme.
- () Há redução de crises convulsivas em indivíduos com distúrbios convulsivos.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – F – V – F.
- (B) F – V – F – F.
- (C) V – F – V – V.
- (D) V – V – V – V.
- (E) F – F – F – V.

14. Sobre as doenças que atingem a bolsa escrotal em adolescentes, assinale a afirmativa correta.

- (A) Dor na região genital e presença de aumento do volume da bolsa escrotal são as alterações mais frequentes nos casos de epididimite, hidrocele, espermatocele e hérnia inguinal.
- (B) História prévia de criptorquidia está relacionada a maior risco de tumor de testículo, sendo o teratoma a neoplasia mais prevalente, seguida pelos tumores das células de Leydig.
- (C) A causa mais frequente de epididimite em adolescentes é infecção por *Chlamydia trachomatis* e *Neisseria gonorrhoeae*.
- (D) A torção de cordão espermático geralmente apresenta-se com dor aguda na bolsa escrotal, febre moderada, bolsa escrotal avermelhada e aumento do volume de um dos testículos.
- (E) Hidrocele caracteriza-se por massa escrotal cística, indolor, macia e transluminável, resultante do aumento da pressão e de válvulas venosas incompetentes nas veias espermáticas internas.

15. Considere as seguintes afirmações sobre manifestações clínicas das infecções sexualmente transmissíveis causadas por *Neisseria gonorrhoeae* (gonococo) e *Chlamydia trachomatis* (clamídia) em adolescentes.

- I - Essas infecções apresentam manifestações semelhantes e podem ocorrer simultaneamente no mesmo indivíduo.
- II - A maioria dos casos clínicos das duas infecções podem inicialmente permanecer sem sintomas em ambos os sexos.
- III- No sexo masculino, o gonococo tem um período de incubação maior do que pela clamídia.
- IV - No sexo feminino, os sinais e sintomas por gonococo são mais específicos do que pela clamídia.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas III e IV.
- (C) Apenas I, II e III.
- (D) Apenas I, II e IV.
- (E) Apenas II, III e IV.

16. Sobre escoliose na adolescência, assinale a afirmativa correta.

- (A) A maioria dos casos tem como causa alguma doença primária que necessita ser identificada e tratada.
- (B) Há maior risco de progressão no sexo masculino do que no feminino.
- (C) Curvas de 5 a 10° em adolescentes têm significância clínica, pois a maioria destes casos progride e está associada com consequências clínicas e psicológicas.
- (D) O exame físico de rotina da coluna vertebral dos adolescentes é geralmente suficiente para diagnóstico de escoliose, que geralmente apresenta-se sem sintomas.
- (E) O exame físico de rotina da coluna vertebral é essencial apenas durante o estirão de crescimento.

17. Sobre anorexia nervosa na adolescência, assinale a afirmativa correta.

- (A) Anorexia nervosa acomete de quatro a cinco vezes mais pessoas do sexo feminino do que do masculino.
- (B) O diagnóstico de anorexia nervosa deve ser considerado principalmente na presença de baixo rendimento físico, perda de peso e recusa alimentar.
- (C) O tratamento da anorexia nervosa deve ser iniciado por um profissional da área de saúde mental, por ser baseado em psicoterapia e psicofármacos.
- (D) O diagnóstico de anorexia nervosa deve ser desconsiderado se ocorreram episódios purgativos nos últimos três meses.
- (E) Entre as complicações cardiovasculares, podem ocorrer redução da contratilidade do miocárdio e prolapso de válvula mitral.

18. Em relação ao uso e abuso de substâncias psicoativas na adolescência, assinale a afirmativa correta.

- (A) O álcool e a cocaína são detectáveis na urina, respectivamente, por 12h e por 96 a 144h, enquanto a maconha pode ser detectada na urina por mais de 15 dias no caso do uso por longo tempo.
- (B) Pupila dilatada, vitrificação da córnea, diminuição do reflexo da córnea, nistagmo horizontal, edema palpebral são alguns sinais oculares comuns em pacientes que usam maconha.
- (C) A pressão arterial tende a aumentar com uso de narcóticos e anfetaminas e diminuir com o uso de LSD.
- (D) Entre os fatores de proteção para o uso de álcool por adolescentes, estão pais autoritários ou permissivos e pais com forte demonstração de apoio aos filhos.
- (E) O comportamento dos pais e familiares contribui mais significativamente para a manutenção e abuso do álcool do que a influência e/ou pressão dos pares.

19. Sobre o uso tópico de retinoides no tratamento da acne em adolescentes, considere as afirmações abaixo.

- I - Normaliza a queratinização dentro dos folículos.
- II - Reduz a obstrução e o risco de ruptura folicular.
- III- Potencializa a absorção de outros tratamentos tópicos.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

20. De acordo com a classificação de risco de dislipidemia em adolescentes do *Integrated Guidelines for Cardiovascular Health and Risk Reduction in Children and Adolescents* (categorias: Aceitável, Limítrofe e Alto), considere os resultados de exames laboratoriais nos itens abaixo.

- I - Colesterol total abaixo de 200 mg/dL
- II - Colesterol LDL abaixo de 110 mg/dL
- III- Triglicerídeos abaixo de 130 mg/dL
- IV - Colesterol HDL acima de 45 mg/dL

Quais pertencem à categoria aceitável?

- (A) Apenas I e III.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas II e IV.
- (D) Apenas II, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

21. Assinale a afirmação correta em relação ao diagnóstico da hipertensão arterial sistêmica na adolescência.

- (A) A pressão arterial deve ser aferida em todas as consultas de adolescentes, com base em evidências fortes de sua sensibilidade diagnóstica para hipertensão.
- (B) Ao aferir a pressão arterial, é essencial prestar atenção ao equipamento, por exemplo: esfigmomanômetro calibrado e manguito com largura que ocupe dois terços do braço.
- (C) A técnica para aferição da pressão arterial recomenda utilizar o braço direito, por uma questão de consistência na comparação com as tabelas de referência.
- (D) A pressão arterial sistólica é representada pela primeira fase de Korotkoff, que corresponde ao primeiro som audível, e a diastólica, pela terceira fase de Korotkoff, que corresponde ao abafamento súbito do som.
- (E) As medidas da pressão arterial devem ser verificadas nas tabelas de referência, publicadas pelo Grupo de Trabalho em Hipertensão em Crianças e Adolescentes do *National High Blood Pressure Education*, até os quinze anos; a partir de então, usam-se os parâmetros de adultos.

22. Qual dentre os medicamentos abaixo **NÃO** apresenta como efeito colateral galactorreia e hiperprolactinemia em adolescentes?

- (A) Sertralina.
- (B) Risperidona.
- (C) Amitriptilina.
- (D) Metformina.
- (E) Domperidona.

23. Considere as situações clínicas nos itens abaixo.

- I - Alteração dos ciclos menstruais e/ou anovulação
- II - Sinais clínicos e/ou laboratoriais de hiperandrogenismo
- III- Níveis elevados de prolactina
- IV- Ovários policísticos identificados por ultrassonografia

Quais são critérios utilizados para diagnóstico de síndrome de ovários policísticos, conforme classificação do Consenso de Rotterdam (2003)?

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas III e IV.
- (C) Apenas I, II e III.
- (D) Apenas I, II e IV.
- (E) Apenas II, III e IV.

24. Em relação à cefaleia em adolescentes do tipo enxaqueca (migrânea), assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Alguns episódios podem ser desencadeados por alimentos específicos.
- (B) Há tendência de queixas de dor unilateral em adolescentes mais jovens e bilateral em adolescentes mais velhos.
- (C) Episódios com presença de aura geralmente apresentam manifestações clínicas visuais.
- (D) Episódios sem presença de aura são responsáveis pela maioria das queixas de enxaqueca.
- (E) O padrão dos episódios pode variar com o decorrer do tempo ou com fatores estressores.

25. Considere as afirmações abaixo sobre pielonefrite aguda em adolescentes.

- I - Os fatores de risco são semelhantes aos da infecção do trato urinário.
- II - Tratamento com quinolonas pode ser indicado a partir dos 14 anos de idade.
- III- A principal causa no sexo feminino é a infecção por *Escherichia coli*.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

EDITAL Nº 03/2021 DE PROCESSOS SELETIVOS

GABARITO APÓS RECURSOS

PROCESSO SELETIVO 18

MÉDICO I (Hebiatra do Serviço de Pediatria)

01.	C	11.	A	21.	C
02.	E	12.	C	22.	D
03.	C	13.	C	23.	D
04.	B	14.	C	24.	B
05.	E	15.	A	25.	D
06.	D	16.	D		
07.	C	17.	E		
08.	C	18.	A		
09.	D	19.	E		
10.	B	20.	C		