



EDITAL Nº 07/2021
DE PROCESSOS SELETIVOS (PS)

MISSÃO

Ser um referencial público em saúde, prestando assistência de excelência, gerando conhecimento, formando e agregando pessoas de alta qualificação.

PS 68 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM
(Internação Adulto: Clínica e Cirúrgica)

MATÉRIA	QUESTÕES	PONTUAÇÃO
Conhecimentos Específicos	01 a 40	0,25 cada

ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTAS, com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

Parece que o vento maneia o tempo.



DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA FAURGS E DO HCPA.

Nome do Candidato: _____

Inscrição nº: _____



FAURGS
Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

INSTRUÇÕES

- 1 Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de **40** (quarenta) questões objetivas.
- 3 Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 5 Os candidatos que comparecerem para realizar a prova **não deverão portar** armas, malas, livros, máquinas calculadoras, fones de ouvido, gravadores, *paggers*, *notebooks*, **telefones celulares**, *pen drives* ou quaisquer aparelhos eletrônicos similares, nem utilizar véus, bonés, chapéus, gorros, mantas, lenços, aparelhos auriculares, próteses auditivas, óculos escuros, ou qualquer outro adereço que lhes cubra a cabeça, o pescoço, os olhos, os ouvidos ou parte do rosto, exceto em situações previamente autorizadas pela Comissão do Concurso e/ou em situações determinadas em lei (como o caso presente do uso obrigatório de máscara, em virtude da pandemia do Coronavírus). **Os relógios de pulso serão permitidos, desde que permaneçam sobre a mesa, à vista dos fiscais, até a conclusão da prova.** (conforme subitem 7.10 do Edital de Abertura)
- 6 **É de inteira responsabilidade do candidato comparecer ao local de prova munido de caneta esferográfica, preferencialmente de tinta azul, de escrita grossa, para a adequada realização de sua Prova Escrita. Não será permitido o uso de lápis, marca-textos, régua, lapiseiras/grafites e/ou borrachas durante a realização da prova.** (conforme subitem 7.15.2 do Edital de Abertura)
- 7 Não será permitida nenhuma espécie de consulta em livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem o uso de instrumentos de cálculo ou outros instrumentos eletrônicos, exceto nos casos em que forem pré-estabelecidos no item 13 do Edital. (conforme subitem 7.15.3 do Edital de Abertura)
- 8 Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA a partir do número **41** serão desconsideradas.
- 9 Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 10 A duração da prova é de **três horas (3h)**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 11 **O candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora (1h) após o seu início. Se quiser levar o Caderno de Questões da Prova Escrita, o candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora e meia (1h30min) após o início. O candidato não poderá anotar/copiar o gabarito de suas respostas de prova.**
- 12 **Após concluir a prova e se retirar da sala, o candidato somente poderá se utilizar de sanitários nas dependências do local de prova se for autorizado pela Coordenação do Prédio e se estiver acompanhado de um fiscal.** (conforme subitem 7.15.6 do Edital de Abertura)
- 13 Ao concluir a Prova Escrita, o candidato deverá devolver ao fiscal da sala a Folha de Respostas (Folha Óptica). Se assim não proceder, será excluído do Processo Seletivo. (conforme subitem 7.15.8 do Edital de Abertura)
- 14 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.



01. Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo, sobre recomendações e aspectos relevantes na administração segura de medicamentos.

- () Quanto ao horário, os medicamentos podem ser administrados até 1 hora antes ou 1 hora após o horário aprazado. A regra não se aplica a situações como: primeira dose/dose de ataque, dose única, administração pré-cirúrgica de antibiótico, sedação pré-procedimento, medicamentos de uso concomitante ou sequencial.
- () O paciente tem o direito, após o devido esclarecimento, à recusa de medicamento/tratamento, revogável a qualquer momento. O profissional deve registrar no prontuário o medicamento recusado e o respectivo horário, não sendo necessário oferecê-lo nos demais horários prescritos.
- () Os erros associados ao uso terapêutico de medicamentos podem ser classificados em erros de prescrição, dispensação e administração. Em instituições hospitalares, a ocorrência de erros é frequente, especialmente aqueles relacionados à dispensação e administração de medicamentos.
- () Medicamentos de alta vigilância devem ser identificados de forma diferenciada dos demais e armazenados separadamente em gavetas chaveadas.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – V – V – V.
- (B) V – V – V – F.
- (C) V – F – F – V.
- (D) F – F – F – V.
- (E) V – F – F – F.

02. A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa tem por finalidade recuperar, manter e promover a autonomia e a independência dos indivíduos idosos, direcionando medidas coletivas e individuais de saúde para esse fim, em consonância com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). Sobre esse tema, considere as afirmações abaixo.

- I - O conceito de saúde para o indivíduo idoso se traduz mais pela presença ou pela ausência de doença orgânica do que pela sua condição de autonomia e independência.
- II - Há necessidade de buscar a qualidade da atenção aos indivíduos idosos por meio de ações fundamentadas no paradigma da promoção da saúde.
- III - Há crescente oferta de recursos socioeducativos e de saúde direcionados ao atendimento ao idoso.
- IV - É contínuo e intenso o processo de envelhecimento populacional brasileiro.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e IV.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas II e IV.
- (E) Apenas I, II e III.

03. O "modelo de atenção centrado no cuidado ao usuário, de forma multiprofissional e interdisciplinar" é uma diretriz que faz parte da Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) no âmbito do SUS. Assinale a alternativa que apresenta a portaria em que se encontra essa diretriz.

- (A) Portaria nº 3.410, de 30 de dezembro de 2013.
- (B) Portaria nº 529, de 1º de abril de 2013.
- (C) Portaria nº 3.390, de 30 de dezembro de 2013.
- (D) Portaria nº 793, de 24 de abril de 2012.
- (E) Portaria nº 1.823, de 23 de agosto de 2012.

04. O dispositivo de segurança é um item integrado a _____ do qual faça parte o elemento perfurocortante ou _____ capaz de reduzir _____, seja qual for o seu mecanismo de ativação.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto acima.

- (A) um procedimento – uma tecnologia – o risco de acidente
- (B) um conjunto – uma tecnologia – o risco de infecção
- (C) um procedimento – uma medida – o risco de acidente
- (D) um conjunto – uma tecnologia – o risco de acidente
- (E) um conjunto – uma medida – o risco de trauma

05. Para uma adequada prática de cuidados paliativos são necessários conhecimento e compressão dos princípios norteadores abaixo, **EXCETO** de um deles. Assinale-o.

- (A) Compreender a morte como processo natural, que não deve ser antecipado ou postergado.
- (B) Oferecer o melhor suporte ao paciente, focando na melhoria da qualidade de vida.
- (C) Substituir os cuidados curativos apropriados, acelerando ou adiando a morte, dependendo do curso da doença.
- (D) Iniciar o mais precocemente possível o acompanhamento em cuidados paliativos junto a tratamentos modificadores da doença.
- (E) Promover avaliação, reavaliação e alívio impecável da dor e de outros sintomas geradores de desconforto.

06. Opióide é o grupo de medicamentos mais utilizado no tratamento da dor moderada e intensa, principalmente nos casos de dor oncológica. Os principais efeitos colaterais são

- (A) constipação, sedação e retenção urinária.
- (B) prurido, constipação e ganho de peso.
- (C) mioclonia, retenção urinária e dispneia.
- (D) sedação, prurido e diarreia.
- (E) hiperalgesia, constipação e dispneia.

07. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando os efeitos adversos do uso da hipodermóclise às suas formas de conduta e manejo.

- (1) Celulite
 - (2) Secreção purulenta
 - (3) Edema, calor ou dor persistente
 - (4) Hematoma
 - (5) Necrose
- () Drenagem manual e limpeza com soro fisiológico 0,9%.
 - () Curativo diário, considerar uso de papaína ou hidrogel.
 - () Compressa gelada por 15 minutos.
 - () Fazer nova punção a, pelo menos, 5 cm de distância da anterior.
 - () Fazer nova punção com cateter não agulhado.

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 3 – 5 – 2 – 4 – 1.
- (B) 4 – 1 – 2 – 5 – 3.
- (C) 1 – 4 – 3 – 2 – 5.
- (D) 5 – 3 – 4 – 1 – 2.
- (E) 2 – 5 – 1 – 3 – 4.

08. Em relação aos cuidados com ostomias (colostomias e ileostomias), é correto afirmar que

- (A) o efluente de ileostomia e colostomia não precisam ser quantificados em volume.
- (B) o esvaziamento e a higienização regular da bolsa coletora não influenciam na sua durabilidade, mas promovem conforto para o paciente.
- (C) os aspectos a serem observados no efluente são cor, consistência, quantidade e odor.
- (D) a bolsa coletora deve ser esvaziada sempre que o efluente atingir $\frac{1}{4}$ de sua capacidade.
- (E) a bolsa coletora de sistema de duas peças não deve ser removida, pois diminui sua durabilidade.

09. São complicações potenciais da histerectomia:

- (A) hemorragia, trombose venosa profunda, disfunção vesical e infecção.
- (B) disfunção sexual, desidratação, hemorragia e disfunção respiratória.
- (C) trombose venosa profunda, angina, infecção e desidratação.
- (D) dor torácica, metástase, disfunção vesical e infecção.
- (E) hemorragia, disfunção respiratória, metástase e constipação.

10. O transplante de rim envolve transplantar um rim de doador vivo ou doador morto para um receptor que não apresenta mais função renal. Sobre esse procedimento, considere as seguintes reações.

- I - Hipersensibilidade sobre o enxerto ou rim transplantado.
- II - Febre e ganho de peso.
- III- Oligúria e elevação da pressão arterial.
- IV - Deficiência da cicatrização e edema.

Quais são sinais ou sintomas de rejeição do transplante?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e III.
- (C) Apenas II e IV.
- (D) Apenas I, II e III.
- (E) I, II, III e IV.

11. Em relação à cirurgia bariátrica e às suas complicações potenciais, numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando complicações a manejos ou características.

- (1) Hemorragia
- (2) Tromboembolismo venoso (TEV)
- (3) Refluxo de bile
- (4) Síndrome de dumping
- (5) Disfagia

- () Pode causar dor epigástrica em queimação e vômito.
- () Deve-se orientar o paciente a comer lentamente e mastigar bem o alimento.
- () A deambulação precoce deve ser estimulada assim que possível.
- () Tem maior tendência a ser causada por ruptura do grampo ou sutura.
- () Causa sintomas vasomotores e gastrintestinais.

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 3 – 5 – 2 – 1 – 4.
- (B) 1 – 5 – 2 – 3 – 4.
- (C) 3 – 2 – 4 – 1 – 5.
- (D) 3 – 5 – 2 – 4 – 1.
- (E) 2 – 1 – 4 – 3 – 5.

12. Considere as afirmações abaixo sobre análise das situações de risco e dos acidentes de trabalho ocorridos com materiais perfurocortantes.

- I - A comissão gestora deve estabelecer prioridades considerando situações de risco e acidentes com materiais perfurocortantes que possuem maior probabilidade de transmissão de agentes biológicos veiculados pelo sangue.
- II - O número de trabalhadores expostos às situações de risco de acidentes com materiais perfurocortantes não é de relevância para a comissão gestora.
- III- A comissão gestora deve considerar a frequência de ocorrência de acidentes em procedimentos com utilização de um material perfurocortante específico.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

13. Assim como as infecções hospitalares, algumas outras complicações relativas ao cuidado em saúde têm sido incluídas sob a cobertura da segurança do paciente. Assinale a alternativa que apresenta uma dessas complicações.

- (A) Hipertensão arterial.
- (B) Hipoglicemia.
- (C) Úlcera por pressão.
- (D) Edema de membros inferiores.
- (E) Não aceitação da alimentação.

14. Assinale a alternativa que apresenta um fator de risco para que ocorram quedas de pacientes no hospital.

- (A) Perda de peso.
- (B) Contenção mecânica.
- (C) Diminuição do volume urinário.
- (D) Fraqueza muscular.
- (E) Obesidade.

15. Assinale a alternativa que corresponde a um dos artigos que compõem o Capítulo I – dos Direitos, contido no Novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (Resolução COFEN nº 564/2017).

- (A) Exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade.
- (B) Participar da prática multiprofissional, interdisciplinar e transdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade, observando os preceitos éticos e legais da profissão.
- (C) Manter regularizadas as obrigações financeiras junto ao Conselho Regional de Enfermagem de sua jurisdição.
- (D) Prestar serviços que, por sua natureza, competem a outro profissional, exceto em caso de emergência, ou que estiverem expressamente autorizados na legislação vigente.
- (E) Incentivar e apoiar a participação dos profissionais de Enfermagem no desempenho de atividades em organizações da categoria.

16. A Ergonomia, também conhecida como a “Engenharia dos Fatores Humanos”, é uma importante ferramenta que visa à saúde do trabalhador e ao desenvolvimento e à aplicação de técnicas de adaptação do homem ao seu ambiente de trabalho, dividindo-se em três campos. Assinale a alternativa que indica esses campos.

- (A) Físico, cognitivo e ambiental.
- (B) Social, produtivo e mental.
- (C) Intelectual, ambiental e social.
- (D) Cognitivo, social e físico.
- (E) Físico, social e ambiental.

17. No que se refere a riscos ergonômicos, considere os seguintes itens.

- I - Trabalhos realizados em pé durante toda a jornada.
- II - Sistemas de retribuição de acordo com o rendimento.
- III- Esforços repetitivos.

Quais são considerados riscos ergonômicos pela Norma Regulamentadora nº 17 (NR-17)?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

18. O termo "resiliência" vem da Física e refere-se à capacidade que um corpo tem de sofrer deformação pela ação de um agente externo e voltar à sua forma natural. Fazendo uma analogia com os aspectos emocionais, considere as seguintes afirmações sobre resiliência.

- I - Envolve flexibilidade, otimismo, ousadia, autoestima e autoconfiança.
- II - O indivíduo depara-se com um evento estressor, vivencia seu impacto, mas não desenvolve sintomas crônicos, retornando à qualidade satisfatória de vida.
- III- A percepção de si e das suas capacidades de lidar com o trauma são importantes preditivos de resultados satisfatórios.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

19. Assinale a alternativa que apresenta o princípio do SUS que assegura o acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.

- (A) Descentralização.
- (B) Universalidade.
- (C) Centralização.
- (D) Equidade.
- (E) Integralidade.

20. Considerando as Metas Internacionais de Segurança do Paciente, assinale a alternativa que **NÃO** corresponde à adoção de práticas seguras na identificação do paciente.

- (A) Estabelecer protocolos de identificação para pacientes que se encontrem sem condições de comunicação verbal adequada, como pacientes pediátricos, sedados, comatosos e/ou desorientados.
- (B) O uso de tecnologias requer planejamento institucional e treinamento dos profissionais para que sejam utilizadas como se pretende e com segurança. No uso de pulseira com código de barras, deve-se considerar restrições, como recém-nascidos, crianças e pacientes em precaução de contato.
- (C) Adotar institucionalmente pelo menos dois identificadores para o paciente (por exemplo, nome e número do quarto), conforme recomendado pela Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente.
- (D) No caso de instituições que adotem o uso de pulseiras é recomendado que estas sejam em número limitado e nas seguintes cores: branca para identificar o paciente, vermelha para alerta de alergias, amarela para alerta de risco de quedas.
- (E) A identificação do paciente pode ser feita por diversos meios, mas sempre é necessário considerar e minimizar a ocorrência de falhas, independentemente da forma utilizada. Entre elas, os sistemas automatizados, como código de barras, identificação por radiofrequência e biometria, reduzem consideravelmente a ocorrência de erros.

21. Em relação a cuidados com a administração de nutrição enteral, assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () O volume recomendado para lavar a SNE em pacientes adultos é de 20 mL de água filtrada ou conforme orientação do serviço.
- () Durante a administração da dieta, o paciente deve estar com a cabeceira elevada de 30° a 45°.
- () O equipo de dieta deve ser lavado após cada infusão e trocado a cada 48 horas.
- () A dieta deve ser infundida no prazo máximo de 30 minutos.
- () O tempo de validade da dieta é de 180 minutos após o recebimento na unidade.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – V – F – F.
- (B) F – F – F – V – V.
- (C) V – V – F – F – V.
- (D) V – F – V – F – V.
- (E) F – F – V – V – F.

22. Foi prescrito para um paciente 1.500 mg de cefazolina, diluída em 500 mL de SF 0,9% para correr em 6 horas. A farmácia dispensa ao paciente dois frascos-ampolas de 1g de cefazolina. O membro da equipe de Enfermagem responsável por administrar a medicação no paciente reconstituiu os dois frascos de cefazolina em 10 mL de água destilada.

Considerando esse caso, qual volume deve ser aspirado do frasco-ampola e qual gotejo deve ser empregado para infusão da medicação, respectivamente?

- (A) 2,5 mL e 33 gts/min.
- (B) 2,5 mL e 40 gts/min.
- (C) 7,5 mL e 28 gts/ min.
- (D) 7,5 mL e 40 gts/min.
- (E) 10 mL e 33 gts/min.

23. Considere as afirmativas abaixo sobre o acidente vascular cerebral isquêmico (AVCI).

- I - A idade avançada tem impacto negativo na morbidade, na mortalidade e na recuperação no longo prazo. Idosos (acima de 65 anos) têm uma chance maior de falecer em até 2 meses após um AVCI.
- II - Confusão, dificuldade de falar, tontura, cefaleia intensa e súbita, estão entre os sinais de alerta para o AVCI.
- III- A maior parte da recuperação ocorre nos primeiros 3 a 6 meses pós-AVCI, mas alguns pacientes ainda conseguem melhoras até 18 meses após o evento.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

24. Considere as afirmações abaixo sobre medicamentos para dor.

- I - Naproxeno, dipirona e paracetamol são considerados opioides simples, utilizados como primeira escolha na dor moderada ou intensa.
- II - A morfina simples, por sua meia-vida curta e seu início de ação rápida, costuma ser a droga de escolha para analgesia de resgate em pacientes em uso de opioides fortes.
- III- A metadona é um medicamento de tratamento da dor moderada e intensa, podendo ser administrado por via oral, endovenosa, subcutânea e hipodermóclise.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

25. O coronavírus causa infecções respiratórias e intestinais em humanos e animais. A maioria das infecções por coronavírus em humanos são causadas por espécies de baixa patogenicidade, levando ao desenvolvimento de sintomas de resfriado comum. No entanto, podem, eventualmente, levar a infecções graves, especialmente em grupos de risco.

Sobre a infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2, agente etiológico da doença conhecida como COVID-19, assinale as afirmativas abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () Não está recomendado aos serviços de saúde o estabelecimento de fluxo diferenciado, com áreas exclusivas para o atendimento de pacientes com sintomas respiratórios, na ausência/impossibilidade/escassez de áreas de isolamento.
- () O período médio de incubação da infecção por SARS-CoV-2 é estimado em 1 a 4 dias, com intervalo que pode variar de 0 a 6 dias.
- () São considerados fatores de risco para possíveis complicações: adulto com idade igual ou superior a 60 anos, presença de distúrbios metabólicos, crianças menores de 5 anos.
- () Sua transmissão entre humanos ocorre principalmente por meio do contato com pessoas sintomáticas, especialmente através das mãos não higienizadas e pelo contato com gotículas respiratórias oriundas de pacientes.
- () Considerando um quadro de síndrome da resposta inflamatória sistêmica (sepse) com disfunção orgânica na presença de infecção presumida ou confirmada, são sinais frequentes: alteração do nível de consciência, oligúria, taquipneia e/ou dispneia, baixa saturação de oxigênio, taquicardia.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – F – F – V.
- (B) F – F – V – V – F.
- (C) V – F – V – F – F.
- (D) F – V – F – F – V.
- (E) F – F – V – V – V.

26. A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível que afeta prioritariamente os pulmões, embora possa acometer outros órgãos e/ou sistemas. Em relação à tuberculose, considere as seguintes afirmações.

- I - É causada pelo bacilo de Koch, e o seu tratamento é à base de antibióticos, tendo duração de 3 meses.
- II - A contaminação é direta e ocorre de pessoa a pessoa, por gotículas de saliva, tosse ou espirro.
- III- O período de incubação é de 4 a 12 semanas após a infecção, com desenvolvimento de reação tuberculínica positiva.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) Apenas II e III.

27. As aspirações de vias respiratórias são indicadas para pacientes com dificuldade para tossir ou expelir secreções. Assinale a alternativa que apresenta o procedimento correto no que se refere à aspiração de vias aéreas superiores.

- (A) Introduza a sonda por uma das narinas cerca de 16 cm, da ponta do nariz à base da orelha, e retire-a com movimentos rotatórios e aplicando vácuo.
- (B) Dê intervalos de pelo menos 1 minuto para o paciente tossir; se o paciente apresentar náuseas, peça que ele fique calmo e prossiga o procedimento.
- (C) Aspire a boca aplicando pressão, fazendo movimentos rotatórios fortes até que a secreção seja removida.
- (D) Coloque o paciente na posição ventral ou deitado, com a cabeça em hiperextensão (se não houver contra-indicação).
- (E) Descartar as sondas de PVC somente após seu desgaste físico (observando o prazo de validade).

28. A realização de curativos em feridas operatórias tem como objetivo promover um ambiente adequado para a reparação tecidual, sem complicações. Sobre cuidados com os curativos em ferida operatória, assinale a alternativa correta.

- (A) O curativo no dreno de penrose deve ser isolado do curativo da ferida operatória, sempre que possível, e trocado todas as vezes que apresentar umidade.
- (B) A quantidade de exsudato não determina a frequência de realização do curativo.
- (C) Não é necessário proteger o curativo durante o banho.
- (D) Recomenda-se que o primeiro curativo permaneça por até 72 horas, se não houver contraindicação.
- (E) O uso de luvas dispensa a lavagem de mãos antes da realização do curativo.

29. O choque hipovolêmico é o tipo mais comum de choque no pós-operatório. São sinais clássicos do choque hipovolêmico os abaixo listados, **EXCETO** um deles. Assinale-o.

- (A) Palidez.
- (B) Pele fria e úmida.
- (C) Pulso rápido, fraco e filiforme.
- (D) Pressão arterial baixa.
- (E) Bradipneia.

30. Os sinais de Chvostek e Trousseau são utilizados para identificar hipocalcemia em pacientes submetidos a

- (A) tireoidectomia.
- (B) apendicectomia.
- (C) colecistectomia.
- (D) segmentectomia.
- (E) prostatectomia.

31. Sobre a deambulação precoce no pós-operatório, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) reduz a distensão abdominal.
- (B) previne eventos tromboembólicos.
- (C) a dor é frequentemente diminuída.
- (D) não apresenta efeito significativo na prevenção de atelectasias.
- (E) diminui o tempo de internação hospitalar.

32. Considere as afirmações abaixo sobre a dor.

- I - A dor com frequência é descrita como sendo aguda ou crônica.
- II - A dor pode ser classificada como dor nociceptiva ou dor neuropática.
- III - Pacientes podem apresentar uma combinação de dor nociceptiva e dor neuropática.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

33. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando cada termo à sua respectiva definição.

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> (1) Cicatrização por primeira intenção (2) Cicatrização por segunda intenção (3) Cicatrização por terceira intenção (4) Deiscência (5) Evisceração | <ul style="list-style-type: none"> () Método pelo qual a aproximação cirúrgica das bordas da ferida é tardia e a continuidade tegumentar é restaurada por áreas de granulação opostas. () Protrusão de órgãos através da incisão cirúrgica. () Método pelo qual as bordas são aproximadas cirurgicamente e a continuidade da pele é restaurada sem granulação. () Método pelo qual as bordas não são aproximadas cirurgicamente e a continuidade da pele é restaurada pelo processo conhecido como granulação. () Separação parcial ou total das bordas da ferida. |
|--|--|

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 4 – 5 – 1 – 3 – 2.
- (B) 3 – 5 – 1 – 2 – 4.
- (C) 3 – 4 – 1 – 2 – 5.
- (D) 3 – 4 – 5 – 1 – 2.
- (E) 4 – 2 – 5 – 1 – 3.

34. A higienização das mãos é, com certeza, uma das práticas de maior relevância no cuidado à saúde das pessoas. Numere a coluna abaixo de 1 a 5, conforme a ordem correta dos momentos para a higienização das mãos.

- () Após contato com as áreas próximas ao paciente.
- () Antes da realização de procedimento asséptico.
- () Antes de contato com o paciente.
- () Após contato com o paciente.
- () Após risco de exposição a fluidos.

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 5 – 2 – 1 – 4 – 3.
- (B) 1 – 2 – 4 – 3 – 5.
- (C) 2 – 1 – 5 – 4 – 3.
- (D) 5 – 3 – 1 – 2 – 4.
- (E) 5 – 1 – 2 – 3 – 4.

35. Assinale a alternativa que **NÃO** apresenta um sinal clínico clássico de sepse.

- (A) Taquipneia.
- (B) Hipotensão.
- (C) Bradicardia.
- (D) Oligúria.
- (E) Confusão mental.

36. O Diabetes Mellito comumente designado como diabetes, abrange um grupo de doenças metabólicas, caracterizadas por níveis elevados de glicose no sangue, devido a defeitos na secreção ou na ação da insulina ou em ambas. Classifica-se como: diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional e Diabetes Mellito em associação a outras condições ou síndromes.

Sobre o diabetes, assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () O diabetes tipo 1 tem início súbito, geralmente antes dos 30 anos de idade.
- () Cerca de 95% dos pacientes com diabetes apresenta diabetes tipo 2.
- () O diabetes tipo 2 sempre deve ser tratado com antidiabéticos orais e, posteriormente, deve-se associar exercícios físicos e dieta equilibrada.
- () Os principais tratamentos do diabetes tipo 1 consistem em redução de peso e modificações nutricionais.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – F – F.
- (B) V – V – V – V.
- (C) F – F – V – V.
- (D) F – F – F – F.
- (E) V – F – V – F.

37. A queda é definida como um deslocamento não intencional do corpo para um nível inferior à posição inicial, provocado por circunstâncias multifatoriais, resultando ou não em dano para o paciente. Sobre esse tema, considere as seguintes afirmações.

- I - Sedentarismo, presença de fraqueza muscular, dificuldade para andar, utilização de quatro ou mais medicamentos por dia e dificuldade em realizar atividades da vida diária são fatores de riscos importantes para quedas.
- II - Mais de 70% das quedas em pacientes hospitalizados ocorrem na deambulação, durante o trajeto de ida e volta ao banheiro, e cerca de 19% ocorrem no quarto, durante a transferência da cama, cadeira ou cadeira de rodas.
- III- A queda está entre os principais eventos adversos que podem ser prevenidos em instituições de saúde e é um dos mais sensíveis indicadores de qualidade e segurança do paciente.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

38. A lesão por pressão caracteriza-se por dano localizado na pele e/ou tecidos moles adjacentes, geralmente sobre uma proeminência óssea ou relacionada ao uso de dispositivo médico ou a outro artefato. O sistema atual de classificação de lesões por pressão inclui definições relacionadas aos estágios das lesões. Sobre esse tema, assinale a afirmativa correta.

- (A) O estágio 1 caracteriza-se por pele íntegra com área localizada de eritema que embranquece e pode parecer diferente em pele de cor escura.
- (B) No estágio 2, o leito da ferida é viável, de coloração rosa ou vermelha, úmido e pode também apresentar-se como uma bolha intacta contendo exsudato seroso ou rompida.
- (C) No estágio 3, há exposição da fáscia, músculo, tendão, ligamento, cartilagem e/ou osso.
- (D) No estágio 4, não há exposição da fáscia, músculo, tendão, ligamento, cartilagem e/ou osso.
- (E) Os estágios 2 e 4 são semelhantes, porém no estágio 4 a lesão é muito mais profunda e sangra continuamente.

39. De acordo com a Lei nº 7.498/86, que regulamenta o exercício profissional da Enfermagem, o técnico de Enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de Enfermagem. Assinale a afirmativa que **NÃO** apresenta uma atividade do técnico de Enfermagem.

- (A) Participar da programação da assistência de Enfermagem.
- (B) Participar da orientação e da supervisão do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar.
- (C) Realizar consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de Enfermagem.
- (D) Executar ações assistenciais de Enfermagem, exceto as privativas do enfermeiro.
- (E) Integrar a equipe de saúde.

40. Assinale a alternativa que apresenta um princípio fundamental que consta do Código de Ética de Enfermagem.

- (A) Não poder recusar-se a executar nenhuma atividade que lhe for solicitada durante seu turno de trabalho.
- (B) Participar de movimentos reivindicatórios por melhores condições de assistência, condições de trabalho e remuneração.
- (C) Prestar assistência à saúde visando à promoção do ser humano como um todo.
- (D) Prestar assistência à clientela sem discriminações de qualquer natureza.
- (E) Respeitar o natural pudor, a privacidade e a intimidade do cliente.

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

EDITAL Nº 07/2021 DE PROCESSOS SELETIVOS

GABARITO APÓS RECURSOS

PROCESSO SELETIVO 68

TÉCNICO DE ENFERMAGEM (Internação Adulto: Clínica e Cirúrgica)

01.	D	11.	A	21.	C	31.	D
02.	D	12.	D	22.	C	32.	E
03.	C	13.	C	23.	E	33.	B
04.	D	14.	D	24.	D	34.	A
05.	C	15.	B	25.	E	35.	C
06.	A	16.	A	26.	E	36.	A
07.	E	17.	D	27.	A	37.	D
08.	C	18.	E	28.	A	38.	B
09.	A	19.	B	29.	E	39.	C
10.	D	20.	C	30.	A	40.	C