

Porto Alegre, 13 de fevereiro de 2023.

Processo Seletivo Simplificado 03/2023

Resposta de Recursos da Prova Objetiva do cargo 01

1.

Nome do Cargo	Nome	Questão	Recurso
Cargo 01 -Teleconsultor Medicina – Cardiologia Adulto	Alan Pagnoncelli	1	Deferido
Cargo 01 -Teleconsultor Medicina – Cardiologia Adulto	Simone Gloger Melo	1	Deferido
Cargo 01 -Teleconsultor Medicina – Cardiologia Adulto	Simone Gloger Melo	4	Indeferido

Porto Alegre, 13 de fevereiro de 2023.

2. RECURSO CONTRA AS QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA CARGO 01

Reavaliar mudança de gabarito da questão 1 (Alternativa C para D).

QUESTÃO 1: Paciente feminina, 65 anos, HAS, hipotireoidismo. Queixa-se de varizes de membros inferiores, refere dor eventual quando fica muito tempo em pé, trabalha como diarista. Ao exame físico apresenta pulsos palpáveis e simétricos, boa perfusão, membros aquecidos, apresenta telangiectasias, veias reticulares e veias varicosas, com edema e hiperpigmentação. A respeito do manejo desta paciente, assinale a alternativa correta:

A) Paciente possui indicação inequívoca de tratamento definitivo cirúrgico e deve ser encaminhada à cirurgia vascular.

B) É necessário solicitar ecodoppler arterial e na indisponibilidade do exame, encaminhar para a cirurgia vascular.

C) Deve-se otimizar medidas conservadoras para insuficiência venosa, como uso de meias elásticas, atividade física com fortalecimento da panturrilha e cilostazol.

D) Deve-se otimizar medidas conservadoras para insuficiência venosa, como uso de meias elásticas e atividade física com fortalecimento da panturrilha.

E) Antes de iniciar tratamento para insuficiência venosa, deve-se solicitar ecodoppler venoso para definição de diagnóstico.

OBJETIVO DO RECURSO: Trocar o gabarito para alternativa D como correta. Abaixo os argumentos para tal mudança.

Foi dado como gabarito a alternativa C como correta. Pelo enunciado da questão trata-se de uma Insuficiência venosa periférica. É característica da insuficiência venosa telangiectasias, veias varicosas, hiperpigmentação, veias reticulares, membros aquecidos, boa perfusão e pulso palpáveis. Essas características encontram-se bem descritas no material da telessaude da UFRGS (<https://www.ufrgs.br/telessauders/perguntas/como-diferenciar-etilogia-das-ulceras-chronicas-dos-membros-inferiores/>). Quadro abaixo retirado do site mostra que de fato o enunciado relata um caso de insuficiência venosa.

RESPOSTA DA BANCA: DEFERIDO

Porto Alegre, 13 de fevereiro de 2023.

JUSTIFICATIVA: Ocorreu um equívoco na marcação da alternativa correta no formulário de respostas e a banca indica a troca do gabarito de alternativa C para alternativa D como correta.

3. Revisão da questão 4 que questiona sobre a afirmação incorreta sobre Cuidados Paliativos e Prevenção Quaternária.

Alternativa A: Para planejar o cuidado é essencial a definição do prognóstico e do reconhecimento de paciente em fim de vida (últimos dias e horas)

- O planejamento dos cuidados paliativos parte do reconhecimento da presença de uma doença grave, sem perspectiva de tratamento curativo, devendo-se levar em conta o prognóstico da doença, expectativas e desejo do paciente. Contudo, o reconhecimento de paciente em fim de vida não é critério definidor para instituição do mesmo, dado que pode e deveria ser abordado com o paciente e família a partir do diagnóstico de doença incurável sendo inicialmente incorporado na discussão de quais condutas médicas podem trazer benefício ao paciente a partir daquele momento.

Segue transcrição do Uptodate sobre o assunto no tópico Overview of comprehensive patient assessment in palliative care: "Palliative care aims to relieve suffering in all stages of disease and does not have to be limited to end-of-life care. Palliative care may be provided along with curative or life-prolonging treatment. Palliative care also extends to the family's or loved ones' bereavement period."

Sendo assim, a alternativa A parece INCORRETA uma vez que não delimita o assunto a Cuidados Paliativos Exclusivos

Alternativas B, D e E - corretas

Alternativa C: INCORRETA


RESPOSTA DA BANCA: INDEFERIDO

JUSTIFICATIVA: Alternativa correta C. A definição de prognóstico e o reconhecimento de paciente em fim da vida (últimos dias e horas) são importantes para expectativas realistas e são também uma oportunidade de planejar cuidados. As medicações para prevenção primária ou secundária devem ser suspensas.

Referência:

-Pergunta da semana: **Quando e como fazer a suspensão de medicamentos não essenciais em cuidados paliativos?** disponível em: <https://www.ufrgs.br/telessauders/perguntas/quando-e-como-fazer-a-suspensao-de-medicamentos-nao-essenciais-em-cuidados-paliativos/>. Acesso em: 13 fevereiro de 2023.

Roberto Nunes Umpierre
Coordenador Projeto TelessaúdeRS-UFRGS


Roberto Nunes Umpierre
Professor
FAMED UFRGS
TelessaúdeRS