



EDITAL Nº 06/2021
DE PROCESSOS SELETIVOS (PS)

MISSÃO

Ser um referencial público em saúde, prestando assistência de excelência, gerando conhecimento, formando e agregando pessoas de alta qualificação.

PS 52 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM
(Unidade de Centro Cirúrgico,
Sala de Recuperação Pós-Anestésica,
Centro Cirúrgico Ambulatorial e/ou
Centro de Material e Esterilização)

| MATÉRIA | QUESTÕES | PONTUAÇÃO |
|---------------------------|----------|-----------|
| Conhecimentos Específicos | 01 a 40 | 0,25 cada |

ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTAS, com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

Macaco velho não pula em galho seco.



DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA FAURGS E DO HCPA.

Nome do Candidato: _____

Inscrição nº: _____



FAURGS
Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

INSTRUÇÕES

- 1 Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de **40** (quarenta) questões objetivas.
- 3 Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 5 Os candidatos que comparecerem para realizar a prova **não deverão portar** armas, malas, livros, máquinas calculadoras, fones de ouvido, gravadores, *paggers*, *notebooks*, **telefones celulares**, *pen drives* ou quaisquer aparelhos eletrônicos similares, nem utilizar véus, bonés, chapéus, gorros, mantas, lenços, aparelhos auriculares, próteses auditivas, óculos escuros, ou qualquer outro adereço que lhes cubra a cabeça, o pescoço, os olhos, os ouvidos ou parte do rosto, exceto em situações previamente autorizadas pela Comissão do Concurso e/ou em situações determinadas em lei (como o caso presente do uso obrigatório de máscara, em virtude da pandemia do Coronavírus). **Os relógios de pulso serão permitidos, desde que permaneçam sobre a mesa, à vista dos fiscais, até a conclusão da prova.** (conforme subitem 7.10 do Edital de Abertura)
- 6 **É de inteira responsabilidade do candidato comparecer ao local de prova munido de caneta esferográfica, preferencialmente de tinta azul, de escrita grossa, para a adequada realização de sua Prova Escrita. Não será permitido o uso de lápis, marca-textos, régua, lapiseiras/grafites e/ou borrachas durante a realização da prova.** (conforme subitem 7.15.2 do Edital de Abertura)
- 7 Não será permitida nenhuma espécie de consulta em livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem o uso de instrumentos de cálculo ou outros instrumentos eletrônicos, exceto nos casos em que forem pré-estabelecidos no item 13 do Edital. (conforme subitem 7.15.3 do Edital de Abertura)
- 8 Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA a partir do número **41** serão desconsideradas.
- 9 Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 10 A duração da prova é de **três horas (3h)**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 11 **O candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora (1h) após o seu início. Se quiser levar o Caderno de Questões da Prova Escrita, o candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora e meia (1h30min) após o início. O candidato não poderá anotar/copiar o gabarito de suas respostas de prova.**
- 12 **Após concluir a prova e se retirar da sala, o candidato somente poderá se utilizar de sanitários nas dependências do local de prova se for autorizado pela Coordenação do Prédio e se estiver acompanhado de um fiscal.** (conforme subitem 7.15.6 do Edital de Abertura)
- 13 Ao concluir a Prova Escrita, o candidato deverá devolver ao fiscal da sala a Folha de Respostas (Folha Óptica). Se assim não proceder, será excluído do Processo Seletivo. (conforme subitem 7.15.8 do Edital de Abertura)
- 14 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.



01. Considere as intervenções não farmacológicas abaixo.

- I - Utilizar práticas complementares, como a calatonia, promover o relaxamento, diminuir o estresse, negar a dor, focar a atenção no paciente.
- II - Evitar a movimentação excessiva do paciente, ouvir o paciente, explicar o motivo do medo, oferecer apoio emocional, promover conforto, focar a atenção no paciente.
- III- Desviar a atenção do paciente da dor, minimizar o barulho, realizar aplicações de calor e frio, promover relaxamento, promover conforto.

Quais visam reduzir a ansiedade, o estresse emocional e promover conforto ao paciente?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

02. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a segurança do paciente pode ser alcançada mediante determinadas ações complementares.

Dessa forma, a assistência de enfermagem durante o período pós-operatório _____ concentra-se em intervenções destinadas a _____ ou _____ complicações. Mesmo sendo um procedimento _____ de pequeno porte, o paciente se encontra sob risco permanente de eventos _____ indesejáveis e prejudiciais à sua integridade.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do parágrafo acima.

- (A) mediato – prevenir – tratar – médico – adversos
- (B) imediato – adequar – diagnosticar – médico – secundários
- (C) mediato – curar – diagnosticar – médico – secundários
- (D) imediato – curar – tratar – cirúrgico – adversos
- (E) imediato – prevenir – tratar – cirúrgico – adversos

03. A preocupação com a qualidade da assistência de enfermagem e com a segurança do paciente cirúrgico tem sido uma constante na Sala de Recuperação Pós-Anestésica (SRPA). Uma das finalidades dessa preocupação é oferecer uma intervenção de enfermagem individualizada equiparável ao grau de dependência em que se encontra o paciente. Assim, estima-se que a proporção de técnicos de enfermagem seja de

- (A) 2 técnicos de enfermagem para cada 6 pacientes.
- (B) 1 técnico de enfermagem para cada 3 pacientes.
- (C) 1 técnico de enfermagem para cada 6 pacientes.
- (D) 1 técnico de enfermagem para cada 5 pacientes.
- (E) 2 técnicos de enfermagem para cada 3 pacientes.

04. Em relação às competências do técnico de enfermagem, assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () Presta cuidados de enfermagem aos pacientes designados pelo médico, conforme prescrição médica.
- () Confere o carro de emergência conforme rotina preestabelecida, sem realizar o teste diário do desfibrilador.
- () Notifica o enfermeiro sobre as condições do paciente e eventuais intercorrências, se achar necessário.
- () Participa da melhoria dos processos realizados na unidade, como membro do grupo de trabalho, emitindo opiniões e sugestões.
- () Providencia o material e equipamentos necessários para prestar cuidados adequados a cada paciente.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – V – F – F – V.
- (B) V – V – F – V – F.
- (C) F – V – F – V – V.
- (D) F – F – F – V – F.
- (E) V – F – F – F – V.

05. A Escala de Índice de Steward (0 a 12 anos) tem pontuação máxima de 6. Esta escala facilita a avaliação da dor em pediatria, sendo aplicada para crianças a cada 15 minutos na primeira hora, a cada 30 minutos na segunda hora e a cada hora a partir da terceira hora, de acordo com o despertar da criança. Sobre esse tema, considere os itens abaixo.

- I - Vias aéreas.
- II - Circulação e saturação de oxigênio.
- III- Movimentação e consciência.

Quais desses itens estão incluídos na avaliação acima mencionada?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

06. A prescrição de sedativos e bloqueadores neuromusculares é frequente para os pacientes expostos a diversos fatores na UTI, como privação do sono, decúbito horizontal prolongado e ruído de aparelhos. Os medicamentos com propriedades sedativas são utilizados para

- (A) induzir o sono, aliviar a dor, aumentar a ansiedade, facilitar a ventilação mecânica.
- (B) facilitar a ventilação mecânica, aumentar a ansiedade, controlar a dor.
- (C) induzir o sono, aliviar a dor, promover amnésia durante procedimentos, facilitar a ventilação mecânica.
- (D) aliviar a dor, induzir o sono, promover amnésia durante procedimentos, aumentar a ansiedade.
- (E) dificultar a ventilação mecânica, aliviar a dor, diminuir a ansiedade.

07. Sobre as complicações mais frequentes no período pós-operatório imediato e intervenções de enfermagem, considere os fatores de risco abaixo.

- I - Obesidade e tabagismo.
- II - Pós-operatório de cirurgias de longa duração (mais de três horas).
- III- Uso de opioides e de bloqueadores neuromusculares.

Quais são fatores de risco para complicações respiratórias?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

08. São efeitos indesejáveis dos opioides:

- (A) sedação, sonolência, cefaleia e diarreia.
- (B) depressão respiratória, cefaleia, sonolência e diarreia.
- (C) cefaleia, diarreia, sedação, sonolência e vômito.
- (D) depressão respiratória, sedação, sonolência e náuseas.
- (E) vômito, sedação, cefaleia e diarreia.

09. Operação de Wertheim trata-se

- (A) da correção de prolapso uterino e cistocele.
- (B) da fixação da vagina e útero em sua loja natural e levantamento de bexiga.
- (C) de uma histerectomia abdominal com linfadenectomia pélvica seletiva.
- (D) de uma mastectomia radical sistematizada.
- (E) da suspensão e fixação do útero à parede abdominal.

10. A primeira etapa do *checklist* da Cirurgia Segura é realizada com o paciente

- (A) na sala de operação, logo na sua chegada em sala.
- (B) na sala de recepção.
- (C) na sala de operação, já com a cirurgia em andamento.
- (D) na sala de operação, durante a indução anestésica.
- (E) na sala de operação, no momento da incisão cirúrgica.

11. Após o posicionamento do paciente para o procedimento cirúrgico, deve-se colocar a placa dispersiva, seguindo as recomendações de estar em contato uniforme com o corpo; ser instalada em uma área em que haja massa muscular, o mais _____ possível do sítio cirúrgico, afastada de próteses metálicas, em superfície _____, local sem pelos, com pele íntegra e de _____ massa muscular.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- (A) longe – úmida – pouca
- (B) próximo – seca – grande
- (C) próximo – seca – pouca
- (D) longe – úmida – grande
- (E) longe – seca – grande

12. Sobre os cuidados do posicionamento cirúrgico do paciente na sala de operação, é **INCORRETO** afirmar que se deve

- (A) proteger proeminências ósseas, principalmente, em pacientes idosos, crianças, obesos e desnutridos, para evitar formação de úlceras por pressão, trombozes e compressão da circulação.
- (B) impedir contato direto do paciente com a superfície metálica da mesa de operação.
- (C) cuidar para que os membros inferiores e superiores nunca fiquem pendentes na mesa de operação.
- (D) utilizar múltiplos apoios para melhor acomodar o paciente e evitar compressão de estruturas, bem como adaptar a posição necessária às reais condições do paciente.
- (E) impedir vícios de posicionamento (hiperextensão dos membros e fixação correta do paciente).

13. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando os termos cirúrgicos às suas características.

- (1) Diérese
 (2) Hemostasia
 (3) Exérese
 (4) Síntese
- () Trata-se da cirurgia propriamente dita.
 () Constitui a secção tecidual e libera as estruturas anatômicas.
 () Trata-se da aproximação das bordas dos tecidos seccionados ou ressecados.
 () Conjunto de medidas que previnem, detêm ou coíbem o extravasamento sanguíneo.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 3 – 1 – 4 – 2.
 (B) 1 – 2 – 3 – 4.
 (C) 4 – 1 – 3 – 2.
 (D) 3 – 1 – 2 – 4.
 (E) 3 – 2 – 1 – 4.

14. Considere as afirmações abaixo sobre a gestão de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME).

- I - Órtese compreende qualquer material permanente ou transitório que auxilie as funções de um membro, órgão ou tecido, não ligados ao ato cirúrgico.
 II - Prótese compreende qualquer material permanente ou transitório que substitua total ou parcialmente um membro, órgão ou tecido.
 III- Implante é definido como qualquer produto médico projetado para ser parcialmente introduzido no corpo humano ou para substituir uma superfície epitelial ou ocular, por meio de intervenção cirúrgica, e destinado a permanecer no local após a intervenção.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
 (B) Apenas II.
 (C) Apenas III.
 (D) Apenas I e II.
 (E) I, II e III.

15. Todos os membros da equipe da sala cirúrgica devem usar Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), dependendo da situação de risco, conforme recomendado nas orientações para serviços de saúde: medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo Novo Coronavírus (SARS-CoV-2). A respeito dessas orientações, assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () O paciente cirúrgico deve utilizar a máscara cirúrgica, para controle de fonte, durante sua circulação para o centro cirúrgico, anestésias e para o local de internação após o procedimento.
 () Para evitar a saída do profissional circulante de sala durante o procedimento cirúrgico, recomenda-se disponibilizar um profissional da equipe fora da sala operatória para providenciar materiais, equipamentos e insumos que sejam essenciais para o ato operatório.
 () Deve-se utilizar máscaras N95/PFF2 ou equivalente com válvula de expiração durante procedimentos cirúrgicos.
 () Máscaras de tecido não são EPIs, e dessa forma, não devem ser utilizadas por profissionais de saúde durante a prestação de assistência direta aos pacientes.
 () Para o transporte dos pacientes suspeitos ou confirmados de COVID-19 da sala cirúrgica ao local de internação, o profissional deverá trocar avental e luvas.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – V – V – F – F.
 (B) V – V – F – V – F.
 (C) V – V – F – V – V.
 (D) F – F – V – V – F.
 (E) V – F – V – F – V.

16. A Lista de Verificação divide a cirurgia em três fases, cada uma correspondendo a um momento específico no fluxo normal do procedimento – o período anterior à indução anestésica (_____), o período após a indução e antes da incisão cirúrgica (_____) e o período durante ou imediatamente após o fechamento da ferida, mas anterior à remoção do paciente da sala de operação (_____).

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- (A) entrada – pausa cirúrgica – saída
 (B) pausa cirúrgica – entrada – saída
 (C) entrada – saída – pausa cirúrgica
 (D) saída – pausa cirúrgica – entrada
 (E) pausa cirúrgica – saída – entrada

17. Um processo de equipe para a contagem manual de todos os instrumentais e compressas, no começo e na conclusão da cirurgia, é uma prática padronizada em várias organizações de enfermagem. Com relação à esse tema, é correto afirmar que:

- (A) a contagem deve ser realizada por duas pessoas, tais como o anestesista e o instrumentador.
- (B) se uma contagem for interrompida, esta deve ser reiniciada de onde parou.
- (C) itens incluídos na contagem devem ser removidos da sala operatória até que a contagem final seja concluída e as contagens sejam compatíveis.
- (D) quando uma contagem não puder ser realizada, uma radiografia deve ser obtida após a saída do paciente da sala operatória.
- (E) os resultados das contagens devem ser anunciados de maneira audível ao cirurgião, que deve assentir verbalmente.

18. Com relação às características da Cultura de Segurança, de acordo com a Portaria nº 529/2013, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Cultura que prioriza a segurança acima de metas financeiras e operacionais.
- (B) Cultura que encoraja e recompensa a identificação, a não notificação e a resolução dos problemas relacionados à segurança.
- (C) Cultura na qual todos os trabalhadores, incluídos profissionais envolvidos no cuidado e gestores, assumem responsabilidade pela sua própria segurança, pela segurança de seus colegas, pacientes e familiares.
- (D) Cultura que proporciona recursos, estrutura e responsabilização para a manutenção efetiva da segurança.
- (E) Cultura que, a partir da ocorrência de incidentes, promove o aprendizado organizacional.

19. No que se refere às definições das boas práticas de funcionamento para os serviços de endoscopia, assinale a alternativa correta.

- (A) A pré-limpeza é caracterizada pela remoção da sujidade, presente nos produtos para saúde, somente com água.
- (B) São produtos para saúde não críticos: os que entram em contato com pele não íntegra ou mucosas íntegras colonizadas.
- (C) Produto para saúde de conformação complexa são os que possuem lúmen maior do que cinco milímetros com fundo cego e espaços internos inacessíveis para a fricção direta.
- (D) Rastreabilidade é a capacidade de traçar o histórico, a aplicação ou a localização de um item por meio de informações previamente registradas.
- (E) Na sedação consciente, o paciente, dificilmente, é despertado por comandos verbais, mas responde a estímulos dolorosos.

20. No que diz respeito à infraestrutura e recursos materiais necessários para o funcionamento de um serviço de endoscopia, assinale as afirmativas abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () É proibida a recuperação de pacientes submetidos à sedação ou anestesia não tópica fora da sala de recuperação.
- () A sala de processamento deve prover exaustão forçada de todo ar da sala, com descarga para o exterior da edificação.
- () Para os serviços de endoscopia do tipo II, não é necessária sala de recuperação anestésica.
- () A secagem dos equipamentos com canais é realizada em armário para guarda dos equipamentos na posição vertical.
- () É necessária uma cuba para lavagem, com profundidade suficiente para evitar respingos em suas laterais, no piso e no profissional.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – V – F – V.
- (B) F – F – V – F – V.
- (C) V – V – F – F – V.
- (D) F – F – F – V – V.
- (E) V – F – F – V – F.

21. Para a realização de procedimentos endoscópicos, diagnósticos e intervencionistas, são utilizados equipamentos rígidos ou flexíveis, com via de acesso ao organismo por orifícios exclusivamente naturais. No que se refere ao processamento de equipamentos e acessórios, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- (A) A pré-limpeza do endoscópio deve ser realizada imediatamente após a finalização do procedimento, com remoção da sujidade da superfície externa.
- (B) Quando o equipamento possuir canais, deve haver a introdução de detergente sob pressão nestes, conforme orientação do fabricante.
- (C) Os endoscópios flexíveis, após serem submetidos a processamento, devem ser mantidos em posição vertical com preservação de alinhamento entre as duas extremidades até a sua utilização.
- (D) É necessário realizar a monitorização dos parâmetros indicadores de efetividade dos agentes saneantes que possuem ação antimicrobiana como concentração uma vez na semana.
- (E) As escovas utilizadas na limpeza dos canais endoscópicos, quando passíveis de processamento, devem ser submetidas à limpeza e desinfecção a cada turno de trabalho.

22. A tecnologia envolvendo os procedimentos de endoscopia digestiva evoluiu consideravelmente. Quanto à limpeza e desinfecção de aparelhos endoscópicos, assinale as afirmativas abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () Imediatamente após ser retirado do paciente, com o aparelho ainda conectado na fonte de luz, deve-se aspirar água com detergente enzimático para limpeza do excesso de secreção no canal.
- () O teste de vedação deve ser realizado semanalmente.
- () Deve-se introduzir a escova de limpeza no canal de biópsia até a saída na porção distal e escovar a escova de limpeza ao sair na outra extremidade, antes de tracioná-la de volta.
- () Não é necessário secar/escorrer o aparelho antes de colocá-lo em solução desinfetante.
- () No que se refere à armazenagem dos aparelhos endoscópicos, os mesmos devem ser guardados em maletas próprias, de forma angulada, com a seção de controle para baixo.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – F – V – F – V.
- (B) V – F – V – F – F.
- (C) F – V – F – V – F.
- (D) V – V – V – F – F.
- (E) V – V – V – F – V.

23. A endoftalmite é o termo utilizado para o processo inflamatório que ocorre no interior do globo ocular, decorrente de infecção por microrganismos e é uma das mais temidas complicações após procedimentos oftalmológicos invasivos. Com relação a esse tema, assinale a alternativa correta.

- (A) A antisepsia da área ocular a ser operada não é indicada, pois facilita a entrada de microrganismos através dos poros.
- (B) É indicado uso de colírio de iodopovidona a 5% imediatamente antes do procedimento cirúrgico.
- (C) O conjunto de caneta de facoemulsificação e ponteira devem ser lavados e desinfetados entre uma cirurgia e outra.
- (D) A anestesia peribulbar possibilita a mobilização da pálpebra, auxiliando para a proteção natural dos olhos.
- (E) É recomendado em cirurgias oftalmológicas o uso sistêmico de antimicrobianos para fins de profilaxia no pré-operatório.

24. A avaliação para alta do paciente no pós-operatório de cirurgia ambulatorial deve ser segura e eficaz, e deve seguir padrões e critérios. Quanto à alta hospitalar para as cirurgias ambulatoriais, assinale as afirmativas abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () O paciente deve estar orientado no tempo, espaço e com estabilidade de sinais vitais há pelo menos sessenta minutos.
- () Para os pacientes ambulatoriais, deve-se exigir uma estabilidade física maior do que para os pacientes internados ao receberem alta.
- () Paciente com dor em grande intensidade, com receituário de analgésicos para uso no domicílio, poderá receber alta e, se necessário, procurar um pronto-atendimento.
- () O paciente deve ter capacidade de locomoção igual à pré-operatória e com capacidade de ingerir líquidos.
- () Para os pacientes submetidos a bloqueios regionais, é necessário o retorno da sensibilidade e da força motora.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – F – V – F – V.
- (B) V – F – V – F – F.
- (C) F – V – F – V – F.
- (D) V – F – F – F – V.
- (E) V – V – F – V – V.

25. Considere as afirmações abaixo sobre as complicações mais comuns no pós-operatório de cirurgias urológicas.

- I - Infecção urinária é mais frequente em pacientes com uso prolongado de sonda vesical no pré-operatório.
- II - Retenção urinária pode ocorrer pela persistência de tecido prostático apical, espasmo e edema ao nível do esfíncter uretral.
- III- Com aumento da pressão abdominal, deve-se realizar monitorização constante da saturação de oxigênio, devido ao risco de embolia gasosa.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

26. As cirurgias ambulatoriais são caracterizadas por serem procedimentos de menor porte cirúrgico e pela ausência de necessidade de cuidados especiais no período pós-operatório. Quanto às cirurgias ambulatoriais, assinale a alternativa correta.

- (A) Não há necessidade de procedimentos especializados e de controles rígidos no pós-operatório.
- (B) O paciente não necessita estar acompanhado por um adulto ou responsável.
- (C) Nas cirurgias ambulatoriais, o paciente sempre necessita de pernoite para sua recuperação.
- (D) A seleção do paciente envolve vários fatores de risco, entre eles, os relacionados à própria cirurgia e à anestesia, sendo que, em nível ambulatorial, somente realizam-se procedimentos sob anestesia local ou sedação.
- (E) Uma das desvantagens da cirurgia ambulatorial é o alto risco de infecção hospitalar e o elevado número de complicações pós-operatórias.

27. A temperatura corporal é regulada pelo equilíbrio entre a produção de calor, determinada pelo metabolismo corporal, e a perda de calor da pele para o meio ambiente. Sobre a prevenção da hipotermia perioperatória, assinale **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) para as práticas fortemente recomendadas.

- () Iniciar medidas e pré-aquecimento, principalmente na primeira hora após anestesia.
- () Minimizar exposição corpórea do paciente e remover roupas ou campos molhados.
- () Administrar soluções em temperatura ambiente.
- () Instalar ou manter o equipamento de aquecimento ativo durante o período intraoperatório e pós-operatório.
- () A monitorização da temperatura no intraoperatório está indicada somente para cirurgias de grande porte.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – F – V – F.
- (B) F – V – F – V – F.
- (C) V – V – V – F – V.
- (D) F – V – V – F – V.
- (E) V – F – F – V – F.

28. Considere as afirmações abaixo sobre os deveres que constam no novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.

- I - Deve-se disponibilizar assistência de Enfermagem à coletividade em casos de emergência, epidemia, catástrofe e desastre, sem pleitear vantagens pessoais, quando convocado.
- II - Deve-se registrar no prontuário e em outros documentos as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar de forma clara, objetiva, cronológica, legível, completa e sem rasuras.
- III- Deve-se executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

29. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos de acordo com diretrizes e princípios. Qual das alternativas abaixo **NÃO** apresenta uma diretriz ou princípio do SUS?

- (A) Universalidade de acesso aos serviços de saúde.
- (B) Integralidade de assistência.
- (C) Coordenação do cuidado.
- (D) Participação da comunidade.
- (E) Descentralização.

30. Considere as afirmações abaixo sobre a Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal.

- I - A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, integra-se na vida particular de cada servidor público.
- II - Deve ser comunicado, imediatamente, a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, exigindo as providências cabíveis.
- III- Em todos os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, indireta, autárquica e fundacional, ou em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público, deverá ser criada uma Comissão de Ética.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.



31. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando a classificação dos incidentes relacionados à assistência à saúde.

- (1) *Near miss*
 (2) Evento adverso
 (3) Incidente
- () Evento que resulta em dano ao paciente.
 () Evento que não atinge o paciente.
 () Evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou resulta, em dano desnecessário à saúde.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 2 – 1 – 3.
 (B) 3 – 1 – 2.
 (C) 1 – 3 – 2.
 (D) 1 – 2 – 3.
 (E) 3 – 2 – 1.

32. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando a classificação dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) às suas respectivas características, de acordo com a Resolução da ANVISA nº 222/2018.

- (1) Grupo A
 (2) Grupo B
 (3) Grupo C
 (4) Grupo D
 (5) Grupo E
- () Resíduos contendo produtos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas características, podem apresentar risco de infecção.
 () Resíduos contendo produtos que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares.
 () Resíduos contendo produtos químicos que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade.
 () Resíduos contendo rejeitos radioativos.
 () Resíduos contendo perfurocortantes ou escarificantes.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 5 – 3 – 2 – 1 – 4.
 (B) 4 – 1 – 2 – 3 – 5.
 (C) 1 – 4 – 2 – 3 – 5.
 (D) 2 – 1 – 5 – 3 – 4.
 (E) 5 – 4 – 2 – 3 – 1.

33. Sobre a higienização das mãos, uso de luvas e cuidados com a pele das mãos, que fazem parte do protocolo do Programa Nacional de Segurança do Paciente do Ministério da Saúde, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) o profissional nunca deve tocar, desnecessariamente, superfícies e materiais (tais como telefones, maçanetas, portas) quando estiver com luvas.
 (B) "higiene das mãos" é um termo que se refere, exclusivamente, a lavar as mãos para prevenir a transmissão de microrganismos e, conseqüentemente, evitar que pacientes e profissionais de saúde adquiram infecção relacionada à assistência à saúde.
 (C) a fricção das mãos com preparação alcoólica contendo um agente umectante agride menos a pele do que a higiene com sabonete líquido e água.
 (D) o uso de cremes de proteção para as mãos ajuda a melhorar a condição da pele, desde que sejam compatíveis com os produtos de higiene das mãos e as luvas utilizadas.
 (E) o uso de luvas não altera nem substitui a higienização das mãos; seu uso por profissionais de saúde não deve ser adotado indiscriminadamente.

34. Considere as afirmações abaixo sobre medidas específicas de prevenção e controle de infecções causadas por microrganismos multirresistentes (MDRs).

- I - O controle de MDRs ocorre a partir da adoção de intervenções combinadas: uso das Precauções Padrão, uso de Precauções de Contato até que as culturas de vigilância para os MDRs sejam negativas, educação da equipe de saúde, aprimoramento da limpeza e desinfecção do ambiente e melhorias na comunicação sobre casos de MDRs, dentro e entre as instituições de assistência à saúde.
 II - O banho de clorexidina 2% tem sido usado com sucesso para evitar infecções de MDRs relacionadas à assistência à saúde, tais como infecções da corrente sanguínea, infecções de sítio cirúrgico e para diminuir a colonização de alguns MDRs.
 III - Uma das medidas específicas para prevenção e controle de infecções causadas por *Pseudomonas* e *Acinetobacter* é a utilização de sistemas de sucção fechados para evitar a contaminação do ambiente com aerossóis contendo o microrganismo.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
 (B) Apenas II.
 (C) Apenas III.
 (D) Apenas I e II.
 (E) I, II e III.

35. Considere o trecho a seguir sobre a RDC nº 8, de 27 de fevereiro de 2009, que dispõe sobre as medidas para redução da ocorrência de infecções por *Micobactérias de Crescimento Rápido (MCR)*, em serviços de saúde.

O ciclo *flash* das autoclaves a vácuo não pode ser utilizado como rotina para o processamento do instrumental e produtos para saúde. A utilização do ciclo *flash* das autoclaves a vácuo só pode ocorrer em casos de urgência, como em contaminação acidental de instrumental cirúrgico no procedimento em curso. Este ciclo deve ser monitorado por _____ e _____. Além disso, o ciclo deve ser documentado com as seguintes informações: data, hora, motivo do uso, _____ e nome e assinatura do responsável pelo _____. Este registro deve estar disponível para a avaliação _____.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto acima.

- (A) indicadores químicos – indicador biológico – nome do instrumental – procedimento – da autoridade sanitária
- (B) enfermeiro – técnico de enfermagem – nome do instrumental ou produto para saúde – paciente – da equipe médica
- (C) enfermeiro – técnico de enfermagem – nome da cirurgia – procedimento – do familiar do paciente
- (D) indicadores químicos – equipe médica – nome do instrumental ou produto para saúde – paciente – da autoridade sanitária
- (E) enfermeiro – equipe médica – nome da cirurgia – procedimento – do paciente

36. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando a classificação dos produtos para saúde, de acordo com sua criticidade e conformação às suas características.

- (1) Produto crítico para saúde.
 - (2) Produto semicrítico para saúde.
 - (3) Produto não crítico para saúde.
 - (4) Produto crítico para saúde, de conformação complexa.
 - (5) Produto para saúde, de conformação não complexa.
- () Possui lúmen inferior a cinco milímetros ou com fundo cego, espaços internos inacessíveis para a fricção direta, reentrâncias ou válvulas.
 - () Entra em contato com pele íntegra ou não entra em contato com o paciente. Deve ser submetido, no mínimo, ao processo de limpeza.
 - () Utilizado em procedimentos invasivos com penetração de pele e mucosas adjacentes, tecidos subepiteliais e sistema vascular, incluindo também todos os produtos para saúde que estejam diretamente conectados com esses sistemas. Deve ser submetido ao processo de esterilização, após a limpeza e demais etapas do processo.
 - () Suas superfícies interna e externa podem ser atingidas por escovação durante o processo de limpeza e possui diâmetros superiores a cinco milímetros nas estruturas tubulares.
 - () Entra em contato com pele não íntegra ou mucosas íntegras colonizadas. Deve ser submetido, no mínimo, ao processo de desinfecção, no mínimo, de nível intermediário, após a limpeza.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 5 – 3 – 2 – 1 – 4.
- (B) 4 – 3 – 1 – 5 – 2.
- (C) 1 – 4 – 2 – 3 – 5.
- (D) 4 – 1 – 5 – 3 – 2.
- (E) 5 – 4 – 2 – 1 – 3.

37. Sobre processamento de produtos para saúde, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) o enxágue final de produtos críticos para saúde, utilizados em cirurgias de implantes ortopédicos, oftalmológicos, cirurgias cardíacas e neurológicas deve ser realizado com água potável.
- (B) a limpeza de produtos para saúde com conformações complexas deve ser precedida de limpeza manual e complementada por limpeza automatizada em lavadora ultrassônica ou outro equipamento de eficiência comprovada.
- (C) é obrigatório, para produtos para saúde cujo lúmen tenha diâmetro interno inferior a cinco milímetros, que a fase automatizada da limpeza seja feita em lavadora ultrassônica com conector para canulados e que utilize tecnologia de fluxo intermitente.
- (D) o monitoramento do processo de esterilização deve ser realizado em cada carga, em pacote teste desafio, com integradores químicos (tipo 5 ou 6), segundo rotina definida pelo próprio CME ou empresa processadora.
- (E) os produtos para saúde e o instrumental cirúrgico consignado e disponibilizado pelo distribuidor devem ser submetidos à limpeza por profissionais do CME do serviço de saúde, antes de sua devolução.

38. Sobre monitoramento e controle do processo de esterilização, assinale as afirmativas abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () Realizar controles de rotina do processo de esterilização com o auxílio de controles físicos, químicos e biológicos dispensa a necessidade de qualificar o equipamento de esterilização, anualmente.
- () O indicador químico tipo I é conhecido como indicador externo de exposição, impregnado em fita adesiva, em grau cirúrgico e *tyvek*.
- () Deve ser colocado um indicador biológico em toda carga esterilizada, a qual só deve ser liberada para utilização, após leitura negativa desse indicador.
- () O indicador químico tipo II é conhecido como teste Bowie-Dick, que verifica a presença de gases não condensáveis e vácuo da autoclave.
- () O indicador químico tipo V é designado a reagir a todos os parâmetros críticos de um ciclo de esterilização.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – F – F – V.
- (B) F – V – F – V – V.
- (C) F – V – F – F – V.
- (D) F – F – V – F – F.
- (E) V – F – V – V – F.

39. Motores, serras e aparelhos elétricos, pneumáticos e/ou com bateria são equipamentos utilizados para serrar ossos em cirurgias ortopédicas, cardíacas, neurológicas, entre outras. Em razão de possuírem componentes elétricos sofisticados, necessitam de cuidados especiais durante o seu processamento, a fim de preservar a sua vida útil e evitar intercorrências no período intraoperatório. Sobre o processamento deste material, assinale a afirmação correta, de acordo com as práticas recomendadas pela SOBECC.

- (A) Deve-se realizar a limpeza por imersão e esterilização em vapor de todos os componentes, incluindo peça de mão, bateria, motor, lâminas e brocas, independente de marca.
- (B) Deve-se realizar inspeção visual para observar a presença de resíduos de sujidade, de danos ao aparelho e acessórios, e sempre se lubrificar com óleo de máquina e motores em geral todas as peças incluindo motor, peça de mão e brocas.
- (C) Após o uso, deve-se desconectar cada acessório (motor, peça de mão, protetor de broca, broca, serra e lâmina) e manter todos em um recipiente lavável, próprio para encaminhar à limpeza.
- (D) Deve-se realizar a limpeza manual de peça de mão, bateria, motor, lâminas, brocas e encaminham-se estes para empresa processadora para esterilização em óxido de etileno, uma vez que todos os motores, serras e perfuradores são termossensíveis.
- (E) Deve-se esterilizar motores e serras pneumáticos e/ou com bateria por imersão em glutaraldeído ou ácido peracético ou aldeído, uma vez que há incompatibilidade do processo de esterilização com qualquer alteração de temperatura.

40. O controle na utilização de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME) é de responsabilidade dos profissionais envolvidos na realização do procedimento. É de responsabilidade do profissional responsável ou membro integrante da equipe designado para esse fim o devido preenchimento do registro de utilização. Assinale a alternativa que contém uma orientação em **DESACORDO** com o controle e registro na utilização de OPME.

- (A) Deve haver o registro de consumo da sala cirúrgica, a fixação de etiquetas de rastreabilidade nos documentos e a imediata devolução das OPME não utilizadas, logo após a finalização do ato cirúrgico.
- (B) Devem ser registradas, no documento de consumo da sala e no prontuário do paciente, todas as informações sobre as OPME utilizadas, tais como: nome do produto, fabricante, tamanho, quantitativo e a descrição do implante realizado.
- (C) O dano e a não utilização das OPME no ato cirúrgico deverão ser justificados pelo profissional responsável pelo procedimento, por meio de um documento que discrimine os motivos da perda. O respectivo documento de justificativa será objeto de análise sobre a possibilidade de processamento de material para uso em saúde ou será descartado nos termos da legislação vigente.
- (D) As OPME, os instrumentais e acessórios que necessitem de esterilização devem ser enviados para o Centro de Materiais e Esterilização (CME) com antecedência e mediante registro de informações antes do envio. Os indicativos de rastreabilidade deverão ser anexados à embalagem.
- (E) Todas as OPME estão sob a supervisão e a responsabilidade do diretor técnico dos estabelecimentos de saúde. A responsabilidade não é extensiva aos profissionais da saúde que indicam ou realizam os procedimentos com uso de OPME.

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

EDITAL N° 06/2021 DE PROCESSOS SELETIVOS

GABARITO APÓS RECURSOS

PROCESSO SELETIVO 52

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

(Unidade de Centro Cirúrgico, Sala de Recuperação Pós-Anestésica, Centro Cirúrgico Ambulatorial e/ou Centro de Material e Esterilização)

| | | | | | | | |
|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|
| 01. | C | 11. | B | 21. | D | 31. | A |
| 02. | E | 12. | E | 22. | B | 32. | C |
| 03. | ANULADA | 13. | A | 23. | B | 33. | B |
| 04. | ANULADA | 14. | D | 24. | E | 34. | E |
| 05. | D | 15. | C | 25. | D | 35. | A |
| 06. | C | 16. | A | 26. | A | 36. | B |
| 07. | E | 17. | E | 27. | A | 37. | A |
| 08. | D | 18. | B | 28. | D | 38. | B |
| 09. | C | 19. | D | 29. | C | 39. | C |
| 10. | A | 20. | C | 30. | E | 40. | E |