

CADERNO DE QUESTÕES



HOSPITAL DE
CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS

EDITAL N° 03/2022

DE PROCESSOS SELETIVOS (PS)

Cargo de Nível Superior

PS 12 - FONOAUDIÓLOGO I
(Disfagia)

	MATÉRIA	QUESTÕES	PONTUAÇÃO	
	Conhecimentos Específicos	01 a 25	0,40 cada	

ATENÇÃO

Transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTAS (Folha Óptica), com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

Os olhos são a janela da alma.

Nome do Candidato: _____

Inscrição n°: _____

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA FAURGS E DO HCPA.



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

EDITAL Nº 03/2022 DE PROCESSOS SELETIVOS

GABARITO APÓS RECURSOS

PROCESSO SELETIVO 12

FONOAUDIÓLOGO I (Disfagia)

01.	C	11.	C	21.	E
02.	A	12.	E	22.	A
03.	D	13.	E	23.	D
04.	C	14.	B	24.	D
05.	D	15.	E	25.	B
06.	E	16.	D		
07.	E	17.	D		
08.	E	18.	C		
09.	D	19.	D		
10.	A	20.	D		

INSTRUÇÕES

- 1 Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de **25** (vinte e cinco) questões objetivas.
- 3 Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 5 O candidato que comparecer para realizar a prova **não deverá, sob pena de ser excluído do certame**, portar armas, malas, livros, máquinas calculadoras, fones de ouvido, gravadores, *paggers*, *notebooks*, telefones celulares, *pen drives* ou quaisquer outros tipos de aparelhos eletrônicos, nem utilizar véus, bonés, chapéus, gorros, mantas, lenços, aparelhos auriculares, próteses auditivas, óculos escuros, ou qualquer outro adereço que lhes cubra a cabeça, o pescoço, os olhos, os ouvidos ou parte do rosto, **exceto em situações autorizadas pela Comissão do Concurso e/ou em situações determinadas em lei, como o uso recomendado de máscaras, em virtude da pandemia do Coronavírus. Os relógios de pulso serão permitidos, desde que permaneçam sobre a mesa, à vista dos fiscais, até a conclusão da prova.** (conforme subitem 7.10 do Edital de Abertura)
- 6 **É de inteira responsabilidade do candidato comparecer ao local de prova munido de caneta esferográfica, preferencialmente de tinta azul, de escrita grossa, para a adequada realização de sua Prova Escrita. Não será permitido o uso de lápis, marca-textos, régua, lapiseiras/grafites e/ou borrachas durante a realização da prova.** (conforme subitem 7.15.2 do Edital de Abertura)
- 7 Não será permitida nenhuma espécie de consulta em livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem o uso de instrumentos de cálculo ou outros instrumentos eletrônicos, exceto nos casos em que forem pré-estabelecidos no item 13 do Edital. (conforme subitem 7.15.3 do Edital de Abertura)
- 8 Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA a partir do número **26** serão desconsideradas.
- 9 Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 10 A duração da prova é de **duas horas e trinta minutos (2h30min)**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 11 **O candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora (1h) após o seu início. Se quiser levar o Caderno de Questões da Prova Escrita, o candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora e meia (1h30min) após o início. O candidato não poderá anotar/copiar o gabarito de suas respostas de prova.**
- 12 **Após concluir a prova e se retirar da sala, o candidato somente poderá utilizar os sanitários nas dependências do local de prova se for autorizado pela Coordenação do Prédio e se estiver acompanhado de um fiscal.** (conforme subitem 7.15.6 do Edital de Abertura)
- 13 Ao concluir a Prova Escrita, o candidato deverá devolver ao fiscal da sala a Folha de Respostas (Folha Óptica). Se assim não proceder, será excluído do Processo Seletivo. (conforme subitem 7.15.8 do Edital de Abertura)
- 14 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

01. Com relação ao tratamento adjuvante de radioterapia em pacientes com câncer de cabeça e pescoço, assinale a afirmativa correta.

- (A) Raramente implica xerostomia durante ou após o tratamento.
- (B) Induz à sialorreia e fibrose após o tratamento.
- (C) Implica xerostomia e aumento da produção de muco, juntamente com restrição na mobilidade de órgãos fonoarticulatórios.
- (D) Torna obrigatório o uso de traqueostomia durante o tratamento.
- (E) Induz ao trismo e sialorreia.

02. A laringectomia parcial vertical implica

- (A) disfagia transitória apenas nos primeiros dias de pós-operatório.
- (B) alteração da fase preparatória oral da deglutição.
- (C) distúrbio exclusivo da voz.
- (D) incontinência oral.
- (E) limitação na abertura de boca.

03. Considere as afirmações abaixo sobre avaliação videolaringoscópica da deglutição.

- I - A avaliação videolaringoscópica da deglutição e a videofluoroscopia são consideradas exames padrão-ouro para pacientes com disfagia.
- II - Permite avaliação sensitiva da faringe e laringe.
- III - Testa diferentes consistências, quantifica a aspiração, porém emite radiação.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

04. Considere as medidas gerais para o tratamento da disfagia em doença de Parkinson apresentadas abaixo e assinale a alternativa correta.

- (A) Facilitar a deglutição priorizando que o paciente se alimente sempre na fase *off*, incentivando a ingestão de líquidos na temperatura fria, antes da oferta da refeição.
- (B) Durante a alimentação, incentivar a postura adequada, com ofertas de pequenas porções, priorizando a ingestão de alimentos frios e líquidos sempre espessados.
- (C) Priorizar a alimentação na fase *on*, com porções menores e priorizando líquidos espessados.
- (D) Ofertar sempre alimentos líquidos e sólidos alternados, preferencialmente na fase *on*.
- (E) Indicar precocemente sonda nasogástrica, mantendo via oral de conforto.

05. Nos casos de pacientes com doenças neurológicas com fraqueza muscular, como a esclerose lateral amiotrófica, a miastenia gravis, as neuromiopatias, entre outras,

- (A) a realização de exercícios deve preconizar o emprego de força nas técnicas de reabilitação, visando melhor proteção da via aérea.
- (B) estas são favorecidas pelo Método *Lee Silverman*, uma vez que o método emprega força durante a execução dos exercícios.
- (C) a fonoterapia deverá alternar técnicas de reabilitação que empreguem força e modo prolongado de execução de exercícios.
- (D) é importante observar os sinais de fadiga muscular, pois a realização de técnicas e/ou exercícios, além do limiar de fadiga do indivíduo, pode comprometer a efetiva função de deglutição.
- (E) estas não se beneficiam com técnicas de reabilitação, sendo prioridade o gerenciamento da consistência alimentar.

06. Assinale a alternativa correta sobre as sequelas mais significativas das laringectomias totais.

- (A) Apresentam impacto na deglutição e na voz, sendo indicada a gastrostomia.
- (B) Apresentam repercussão na deglutição e na voz, podendo ser indicada a válvula fonatória.
- (C) Apresentam impacto na voz, podendo ser indicada a válvula fonatória.
- (D) Apresentam impacto na deglutição, podendo ser indicada a prótese laríngea.
- (E) Apresentam impacto na voz, podendo ser indicada a prótese laríngea.

07. Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), considere as redes e os setores de vigilância abaixo.

- I - Redes integradas de assistência de alta complexidade.
- II - Redes de laboratórios de saúde pública.
- III- Vigilância epidemiológica.
- IV- Vigilância sanitária.

Quais competem à direção nacional do SUS definir e coordenar?

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas III e IV.
- (D) Apenas I, II e III.
- (E) I, II, III e IV.

08. Sobre o exame de videofluoroscopia da deglutição, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) é indicado quando sinais e sintomas do paciente são inconsistentes com achados da avaliação clínica.
- (B) o fonoaudiólogo deve modificar a sequência do protocolo quando o paciente apresenta achados alterados.
- (C) a penetração, tradicionalmente vista como alteração, pode ser considerada dentro dos limites funcionais.
- (D) a penetração refere-se à presença de bolo alimentar na laringe, sem que este ultrapasse as pregas vocais e atinja a traqueia.
- (E) não há recomendações acerca do tempo total do exame.

09. Conforme observa-se na prática clínica, há dois conjuntos de doenças que cursam com a disfagia pediátrica. Quais referem-se às condições de melhor prognóstico?

- (A) Anomalias congênitas e alterações respiratórias.
- (B) Doenças neuromusculares e alterações cardíacas.
- (C) Anomalias congênitas e doenças neuromusculares.
- (D) Alterações cardíacas e alterações respiratórias.
- (E) Doenças cardíacas e paralisia cerebral.

10. A sucção não nutritiva (SNN) pode ser realizada com dedo enluvado ou chupeta. Sobre a SNN é correto afirmar que:

- (A) auxilia no processo de maturação do mecanismo de sucção.
- (B) lentifica o trânsito gastrointestinal.
- (C) raramente está associada com saciação.
- (D) compromete o padrão de organização postural.
- (E) propicia gasto energético impactando no ganho ponderal.

11. Considere as afirmações abaixo sobre a atuação fonoaudiológica no paciente com sequência de Pierre Robin.

- I - Caracteriza-se por micrognatia, glossoptose e dificuldades respiratórias de diferentes graus de gravidade. A glossoptose, além de causar alteração na função respiratória, irá alterar a fisiologia normal da sucção/deglutição, provocando dificuldades alimentares.
- II - As dificuldades alimentares são mais intensas nas primeiras semanas. Por volta do 4º mês, o quadro tende a melhorar, pois a laringe começa a descer, provocando um aumento do espaço orofaríngeo. A mandíbula também se alarga e cresce para frente e para baixo, colaborando ainda mais para o aumento deste espaço.
- III- Quando se criam condições favoráveis para anteriorização da língua, a coordenação dos movimentos de sucção, respiração e deglutição torna-se mais organizada, permitindo ao bebê a ingestão mais adequada de leite, apesar de não ter condições para aleitamento natural.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

12. Considere as afirmações abaixo sobre a atuação fonoaudiológica em disfagia infantil.

- I - A recomendação quanto ao uso de espessantes alimentares deve ser cuidadosamente indicada pela restrição de uso antes dos três anos de idade.
- II A intervenção terapêutica para crianças com distúrbio de deglutição na fase oral envolve exercícios para melhorar as habilidades sensoriais e/ou motoras necessárias para a alimentação.
- III- A intervenção terapêutica para crianças com distúrbio de deglutição na fase faríngea busca adequar e modificar o alimento a ser ofertado, reduzindo os riscos de aspiração.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

13. Os principais fármacos utilizados com a finalidade de reduzir o volume salivar são os anticolinérgicos. Em casos de sialorreia, a prescrição médica visa obter o efeito colateral de secura na boca, e não sua ação terapêutica tradicional.

Qual das alternativas abaixo **NÃO** corresponde a um medicamento anticolinérgico utilizado para redução da sialorreia?

- (A) Amitriptilina.
- (B) Atropina.
- (C) Escopolamina.
- (D) Glicopirrolato.
- (E) Ácido acetilsalisílico.

14. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando as monobras de deglutição a seus objetivos.

- (1) Deglutições múltiplas
- (2) Manobra de Mendelsohn
- (3) Manobra de Masako
- (4) Deglutição com esforço
- (5) Deglutição supraglótica
- (6) Deglutição supersupraglótica

- () Proteger a via aérea, maximizando o fechamento das pregas vocais.
- () Reduzir o resíduo após a deglutição.
- () Maximizar a ejeção oral do alimento.
- () Proteger a via aérea, maximizando o fechamento das pregas vocais e pregas ariepiglóticas.
- () Aumentar a movimentação da parede posterior da faringe durante a deglutição.
- () Promover maior extensão e duração da elevação laríngea e, conseqüentemente, aumentar a amplitude e a duração da abertura cricofaríngea.

A seqüência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 3 – 4 – 2 – 1 – 5 – 6.
- (B) 5 – 1 – 4 – 6 – 3 – 2.
- (C) 1 – 4 – 6 – 5 – 2 – 3.
- (D) 5 – 6 – 3 – 1 – 2 – 4.
- (E) 6 – 5 – 2 – 4 – 3 – 1.

15. Sobre válvula de fala de sistema fechado (*bias closed*), assinale a afirmativa correta.

- (A) Para que a membrana da válvula de fala se feche, existe a necessidade de ocorrer a expiração de ar contra a mesma.
- (B) A válvula de fala de sistema fechado não pode ser usada na presença de um ventilador mecânico.
- (C) O *cuff* poderá estar parcialmente desinsuflado durante a adaptação da válvula de fala.
- (D) A válvula de fala é indicada para pacientes traqueostomizados, podendo ser utilizada somente em adultos e idosos.
- (E) O uso da válvula de fala promove a restauração da pressão positiva subglótica, reduzindo a aspiração traqueal.

16. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando os protocolos de avaliação que podem ser utilizados na área de disfagia às suas características.

- (1) Protocolo de Avaliação Preliminar (PAP).
- (2) Protocolo de Avaliação do Risco para Disfagia (PARD).
- (3) Protocolo de Introdução e Transição da Alimentação (PITA) por via oral.
- () É indicado para avaliação de pacientes que estejam em processo de reintrodução da dieta por via oral, com diferentes consistências de alimentos.
- () É dividido em exame geral, respiração, fala, voz, avaliação orofacial e cervical.
- () A primeira parte do protocolo contempla itens de avaliação durante o teste de deglutição da água, e a segunda parte do protocolo, durante o teste de deglutição de alimento pastoso.

A seqüência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 3 – 2.
- (B) 2 – 1 – 3.
- (C) 2 – 3 – 1.
- (D) 3 – 1 – 2.
- (E) 1 – 2 – 3.

17. Conforme a Norma Regulamentadora nº 32 (NR-32 - Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde), o empregador deve assegurar capacitação aos trabalhadores, antes do início das atividades e de forma continuada. Com relação a esse tema, considere as afirmações abaixo.

- I - A capacitação aos trabalhadores deve ser ministrada sempre que ocorra uma mudança das condições de exposição dos trabalhadores aos agentes biológicos.
- II - A capacitação aos trabalhadores deve ser ministrada antes de cada jornada de trabalho e no início de cada biênio.
- III- A capacitação aos trabalhadores deve ser ministrada por profissionais de saúde familiarizados com os riscos inerentes aos agentes biológicos.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

18. Qual das alternativas abaixo apresenta uma etapa da sucção madura?

- (A) Ausência de canolamento de língua.
- (B) Pressão intraoral reduzida.
- (C) Surgimento da sucção rítmica.
- (D) Sucção esporádica.
- (E) *Suckling* desorganizado.

19. Com relação à inervação das regiões oral, nasal, faríngea e laríngea, são responsáveis os seguintes pares cranianos:

- (A) IV (troclear), V (trigêmeo), IX (glossofaríngeo), X (vago), XI (acessório).
- (B) IV (troclear), V (trigêmeo), VI (abducente), X (vago), XI (acessório).
- (C) VI (abducente), VII (facial), IX (glossofaríngeo), XI (acessório), XII (hipoglosso).
- (D) V (trigêmeo), VII (facial), IX (glossofaríngeo), X (vago), XII (hipoglosso).
- (E) V (trigêmeo), VII (facial), IV (troclear), XI (acessório), XII (hipoglosso).

20. Considere os itens abaixo sobre o código de ética do servidor público.

- I - Comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato e fato contrário ao interesse público, exigindo as providências cabíveis.
- II - Ser sindicalizado e participar dos movimentos que se relacionem com a melhoria do exercício de suas funções, tendo por escopo a realização do bem comum.
- III- Apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função.

Quais apresentam deveres fundamentais do servidor público?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

21. Segundo o Código de Ética do Fonoaudiólogo, constitui um direito do profissional em relação às redes sociais:

- (A) discutir casos ou esclarecer dúvidas relativas à prestação de serviço ao cliente quando este for exposto ou facilmente identificável.
- (B) divulgar, sem autorização do cliente e do(s) responsável(is) legal(is), qualquer informação que o identifique.
- (C) anunciar preços, descontos e sorteios, exceto na divulgação de cursos, palestras, seminários e afins.
- (D) consultar, diagnosticar ou prescrever tratamento por quaisquer meios de comunicação de massa.
- (E) criar canais de comunicação com a população.

22. Considere o trecho a seguir sobre a fisiologia da deglutição.

A fase faríngea inicia quando _____ se contrai para fechar o esfíncter velofaríngeo. Simultaneamente, a elevação da língua permite a elevação _____ que facilita o movimento de elevação e anteriorização da laringe, com fechamento das pregas vocais e _____ para proteger a via aérea.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- (A) o palato mole – do hioide – das pregas vestibulares
- (B) a língua – do véu palatino – da valécula
- (C) a língua – do véu palatino – das pregas vestibulares
- (D) o palato mole – do véu palatino – da valécula
- (E) a língua – do hioide – dos recessos piriformes

23. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando mudanças anatomofisiológicas no idoso com as repercussões na alimentação e na dinâmica da deglutição.

- (1) Atrofia dos músculos da língua.
- (2) Deteriorização do aparelho dentário – perdas dentárias/edentulismo.
- (3) Atraso no disparo do reflexo da deglutição.
- (4) Diminuição da força dos músculos supra-hióideos e atraso na abertura do esfíncter esofágico superior.
- (5) Disfunções da motilidade esofágica e dos esfíncteres esofágicos.

- () Problema de mastigação; mudança na consistência alimentar; manipulação lenta do bolo alimentar.
- () Ingestão de bolos alimentares de menor volume; preferência por alimentos mais cozidos; dificuldade na ejeção do bolo alimentar.
- () Limite no trânsito do bolo alimentar da faringe para o estômago.
- () Escape prematuro do bolo alimentar na faringe/laringe.
- () Diminuição da amplitude de elevação e abaixamento da laringe e da transição faringoesofágica.

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 2 – 3 – 5 – 4 – 1.
- (B) 1 – 3 – 4 – 2 – 5.
- (C) 1 – 5 – 3 – 4 – 2.
- (D) 2 – 1 – 5 – 3 – 4.
- (E) 2 – 1 – 4 – 5 – 3.

24. São critérios para avaliação da dinâmica da deglutição, **EXCETO**:

- (A) estabilidade clínica conforme critérios médicos específicos para cada patologia e idade.
- (B) sinais vitais dentro dos limites da normalidade ou basais do paciente.
- (C) estado de alerta suficiente para alimentação segura.
- (D) intervalo de pelo menos 10h da extubação.
- (E) estabilidade respiratória.

25. Dentre os procedimentos no tratamento da disfagia, encontram-se a sonda nasoenteral ou o tubo de gastrostomia. Com relação a esse tema, é correto afirmar que:

- (A) o uso de gastrostomia está indicado em pacientes com disfagia leve, bem como naqueles cujo aporte nutricional proveniente da alimentação por via oral está insuficiente.
- (B) apesar de evitar a aspiração de conteúdo alimentar, o uso de tubos de alimentação não evita a aspiração de saliva, nem de conteúdo gástrico.
- (C) a presença de sonda nasoentérica pode proporcionar melhora nos casos de refluxo gastroesofágico.
- (D) a gastrostomia, a longo prazo, parece ser menos tolerada tanto pelo paciente como por seus cuidadores.
- (E) a remoção da sonda nasoentérica necessita de anestesia e atendimento hospitalar.