

# CADERNO DE QUESTÕES



HOSPITAL DE  
CLÍNICAS  
PORTO ALEGRE RS

**EDITAL N° 03/2022**

DE PROCESSOS SELETIVOS (PS)

Cargo de Nível Superior

**PS 14 - MÉDICO I**  
(Clínico: Medicina Ocupacional)

	MATÉRIA	QUESTÕES	PONTUAÇÃO	
	Conhecimentos Específicos	01 a 25	0,40 cada	

## ATENÇÃO

Transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTAS (Folha Óptica), com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

**Os olhos são a janela da alma.**

Nome do Candidato: \_\_\_\_\_

Inscrição n°: \_\_\_\_\_

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA FAURGS E DO HCPA.



## HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

### EDITAL Nº 03/2022 DE PROCESSOS SELETIVOS

#### GABARITO APÓS RECURSOS

##### PROCESSO SELETIVO 14

##### MÉDICO I (Clínico: Medicina Ocupacional)

01.	<b>B</b>	11.	<b>C</b>	21.	<b>B</b>
02.	<b>A</b>	12.	<b>E</b>	22.	<b>C</b>
03.	<b>A</b>	13.	<b>E</b>	23.	<b>C</b>
04.	<b>C</b>	14.	<b>B</b>	24.	<b>A</b>
05.	<b>B</b>	15.	<b>D</b>	25.	<b>A</b>
06.	<b>D</b>	16.	<b>D</b>		
07.	<b>D</b>	17.	<b>E</b>		
08.	<b>C</b>	18.	<b>D</b>		
09.	<b>D</b>	19.	<b>C</b>		
10.	<b>A</b>	20.	<b>E</b>		

# INSTRUÇÕES

- 1 Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de **25** (vinte e cinco) questões objetivas.
- 3 Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 5 O candidato que comparecer para realizar a prova **não deverá, sob pena de ser excluído do certame**, portar armas, malas, livros, máquinas calculadoras, fones de ouvido, gravadores, *paggers*, *notebooks*, telefones celulares, *pen drives* ou quaisquer outros tipos de aparelhos eletrônicos, nem utilizar véus, bonés, chapéus, gorros, mantas, lenços, aparelhos auriculares, próteses auditivas, óculos escuros, ou qualquer outro adereço que lhes cubra a cabeça, o pescoço, os olhos, os ouvidos ou parte do rosto, **exceto em situações autorizadas pela Comissão do Concurso e/ou em situações determinadas em lei, como o uso recomendado de máscaras, em virtude da pandemia do Coronavírus. Os relógios de pulso serão permitidos, desde que permaneçam sobre a mesa, à vista dos fiscais, até a conclusão da prova.** (conforme subitem 7.10 do Edital de Abertura)
- 6 **É de inteira responsabilidade do candidato comparecer ao local de prova munido de caneta esferográfica, preferencialmente de tinta azul, de escrita grossa, para a adequada realização de sua Prova Escrita. Não será permitido o uso de lápis, marca-textos, régua, lapiseiras/grafites e/ou borrachas durante a realização da prova.** (conforme subitem 7.15.2 do Edital de Abertura)
- 7 Não será permitida nenhuma espécie de consulta em livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem o uso de instrumentos de cálculo ou outros instrumentos eletrônicos, exceto nos casos em que forem pré-estabelecidos no item 13 do Edital. (conforme subitem 7.15.3 do Edital de Abertura)
- 8 Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA a partir do número **26** serão desconsideradas.
- 9 Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 10 A duração da prova é de **duas horas e trinta minutos (2h30min)**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 11 **O candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora (1h) após o seu início. Se quiser levar o Caderno de Questões da Prova Escrita, o candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora e meia (1h30min) após o início. O candidato não poderá anotar/copiar o gabarito de suas respostas de prova.**
- 12 **Após concluir a prova e se retirar da sala, o candidato somente poderá utilizar os sanitários nas dependências do local de prova se for autorizado pela Coordenação do Prédio e se estiver acompanhado de um fiscal.** (conforme subitem 7.15.6 do Edital de Abertura)
- 13 Ao concluir a Prova Escrita, o candidato deverá devolver ao fiscal da sala a Folha de Respostas (Folha Óptica). Se assim não proceder, será excluído do Processo Seletivo. (conforme subitem 7.15.8 do Edital de Abertura)
- 14 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

**01.** Sobre a saúde do trabalhador regido pela CLT, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) é atribuição do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução das ações voltadas para a atenção à saúde do trabalhador, conferindo à direção nacional do SUS a responsabilidade de coordenar a política de saúde do trabalhador.
- (B) os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (CERESTs) e os serviços especializados em Saúde do Trabalhador dos Hospitais Universitários são a porta de entrada para a avaliação inicial dos agravos relacionados ao trabalho.
- (C) as dermatoses ocupacionais devem, obrigatoriamente, ser notificadas através do preenchimento do SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação).
- (D) as doenças profissionais e as doenças do trabalho são consideradas acidentes de trabalho para fins legais.
- (E) na suspeita de uma doença profissional o médico que assistiu o trabalhador, tanto no SUS ou na rede privada, poderá formalizar a emissão da CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho).

**02.** A perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora elevados (PAINPSE) é a diminuição gradual da acuidade auditiva, decorrente da exposição continuada a níveis elevados de ruído no ambiente de trabalho.

A PAINPSE é sempre \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ de progressão quando a exposição ao ruído é cessada.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto acima.

- (A) neurossensorial – irreversível – não passível
- (B) condutiva – irreversível – não passível
- (C) condutiva – reversível – passível
- (D) neurossensorial – reversível – passível
- (E) neurossensorial – irreversível – passível

**03.** Sobre avaliação e manejo das patologias ocupacionais, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) A dermatite de contato alérgica é a forma mais comum de dermatose ocupacional.
- (B) Depois de um período de incubação de 4 a 12 semanas, a infecção por tuberculose permanece habitualmente subclínica ou latente, sem desenvolvimento de doença ativa, mas com teste cutâneo tuberculínico positivo.
- (C) Na epicondilite lateral, a patologia se relaciona mais com fibrose e alterações degenerativas no tendão do que com processos inflamatórios agudos.
- (D) A exposição do trabalhador às radiações ionizantes pode causar catarata.
- (E) O uso de antipiréticos é contraindicado no tratamento da intermação.

**04.** Sobre os transtornos por uso de substâncias, considere as afirmações abaixo.

- I - Síndromes psiquiátricas agudas, incluindo depressão grave, ansiedade e transtornos psicóticos, são comumente induzidas por transtorno por uso de substâncias.
- II - O questionário CAGE é uma ferramenta altamente efetiva para definir o diagnóstico de transtorno por consumo de álcool.
- III- A intoxicação por opioide, geralmente, se inicia com apatia, fala arrastada, seguida por sensação de euforia, midríase, ansiedade e agitação.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

**05.** Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando as exposições crônicas aos metais pesados abaixo listados com seus possíveis desfechos clínicos associados.

- (1) Cádmio.  
 (2) Manganês.  
 (3) Arsênio.  
 (4) Chumbo.
- ( ) Hiperkeratose e hiperpigmentação.  
 ( ) Proteinúria, fraturas patológicas, anosmia.  
 ( ) Artralgia, tremores, cólica abdominal.  
 ( ) Alterações comportamentais, distúrbios vasomotores, disfunção na marcha.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 3 – 2 – 1 – 4.  
 (B) 3 – 1 – 4 – 2.  
 (C) 1 – 4 – 2 – 3.  
 (D) 2 – 1 – 3 – 4.  
 (E) 4 – 2 – 3 – 1.

**06.** Entre os principais diagnósticos diferenciais de Covid-19, deve-se considerar todos os seguintes, **EXCETO**:

- (A) síndrome gripal por *influenza* e resfriado comum.  
 (B) pneumonia bacteriana e tuberculose.  
 (C) coqueluche e rinosinusite.  
 (D) laringite aguda e leptospirose.  
 (E) exacerbação de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e asma.

**07.** Considere as informações abaixo sobre o glaucoma agudo.

- I - O quadro clínico cursa com dor e com vermelhidão ocular intensas, pupila miótica e fotofobia.  
 II - Na sua suspeita, o paciente deve ser referenciado imediatamente para avaliação com oftalmologista.  
 III- Medicamentos com efeito simpaticomiméticos ou anticolinérgicos merecem atenção como fator de risco.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.  
 (B) Apenas II.  
 (C) Apenas I e III.  
 (D) Apenas II e III.  
 (E) I, II e III.

**08.** São considerados pacientes com fatores de risco para complicação por *influenza*, **EXCETO**:

- (A) mulher, de 30 anos, com asma controlada.  
 (B) homem, de 45 anos, com diabetes melito em tratamento, com hemoglobina glicada de 6,5%.  
 (C) mulher, de 55 anos, com sobrepeso (IMC 29), sem atividade física regular.  
 (D) homem, de 65 anos, sem comorbidades.  
 (E) homem, de 20 anos, com anemia falciforme.

**09.** Em relação à migrânea é correto afirmar:

- (A) a migrânea com aura é o subtipo mais comum. Tem uma frequência de crises maior e, em geral, é mais incapacitante.  
 (B) não é exacerbada por atividades físicas rotineiras.  
 (C) os betabloqueadores têm reconhecida efetividade na terapia profilática, dos quais o atenolol é aquele com maior evidência de benefício.  
 (D) nas crises de leve intensidade pode-se iniciar o tratamento com analgésicos comuns ou com anti-inflamatórios.  
 (E) em pacientes com quadro mais grave de migrânea, pode-se associar tomada imediata e simultânea de triptano e de ergotamina para abortar a crise.

**10.** Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo sobre infecção do trato urinário em adultos.

- ( ) A cistite não complicada aguda é mais prevalente em mulheres, sendo mais comumente causada por enterobactérias.  
 ( ) A ocorrência de disúria e de polaciúria tem valor preditivo positivo de 90% para cistite.  
 ( ) A cistite aguda em homens é rara, porém não é necessário exame de imagem já no primeiro episódio.  
 ( ) A bacteriúria assintomática deve ser rastreada e tratada em gestantes, em pacientes diabéticos e em pacientes usuários de sonda vesical de demora.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – F – F.  
 (B) V – V – V – F.  
 (C) V – V – F – V.  
 (D) F – F – V – V.  
 (E) V – F – F – V.

**11.** Mulher, 50 anos, previamente hígida, procura pronto atendimento por tontura rotatória. Quadro iniciado subitamente pela manhã ao acordar (virando-se para desligar despertador), com duração de poucos minutos, com piora ao movimentar a cabeça bruscamente. Nega zumbido, hipoacusia ou alterações visuais. Nega uso de medicações. Nega etilismo. No exame físico, há nistagmo unidirecional horizontal, esgotável. Não há dismetria.

Sobre este caso, considere as afirmações abaixo.

- I - O quadro clínico é sugestivo de vertigem posicional paroxística benigna (VPPB).
- II - O tratamento mais frequentemente utilizado para VPPB é a manobra de Epley.
- III- O tratamento medicamentoso a longo prazo com supressores vestibulares é recomendado.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

**12.** Em relação à litíase renal, é correto afirmar que

- (A) é uma patologia mais frequente em mulheres do que em homens, sendo a primeira apresentação geralmente entre a 3ª e 5ª década de vida.
- (B) os cálculos de ácido úrico e de estruvita são os mais frequentes, seguidos pelos cálculos de cálcio (oxalato ou fosfato).
- (C) a hidratação intravenosa aumenta a chance de passagem do cálculo no cenário de cólica renal por cálculo ureteral.
- (D) a furosemida é o tratamento medicamentoso de escolha para prevenção de recorrência de litíase renal em pacientes diagnosticados com hipercalcúria idiopática (afastada hipercalcemia).
- (E) a tomografia de abdome total sem contraste tem sensibilidade e especificidade superior à ecografia abdominal para diagnóstico de litíase renal.

**13.** Mulher, 30 anos, com diagnóstico de resfriado comum há 7 dias, retorna para reconsulta médica por piora da congestão nasal, surgimento de hiposmia, de prostração e de febre de 38,1°C há 24h. No exame físico, apresenta dor intensa à palpação de seio da face esquerdo; temperatura axilar aferida de 38,2°C.

Com relação a este quadro clínico, considere as afirmações abaixo sobre o tratamento deste caso.

- I - Deve-se prescrever solução salina intranasal.
- II - Corticoide nasal tópico é recomendado.
- III- Antibioticoterapia está indicada.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

**14.** Sobre a dengue, assinale a alternativa correta.

- (A) O período de incubação é curto, geralmente de 2 a 3 dias.
- (B) O teste de detecção de antígeno NS1 é preconizado nos primeiros 5 dias de doença.
- (C) Artralgia intensa e edema articular são sintomas comuns.
- (D) A transfusão profilática de plaquetas é recomendada na plaquetopenia moderada.
- (E) A notificação compulsória desta doença deve ser realizada somente em casos confirmados.

**15.** Sr. Antônio, casado, 3 filhos, 63 anos, aposentado, tabagista desde os 15 anos, 40 cigarros/dia, vem à consulta porque deseja parar de fumar. Refere que já tentou parar de fumar sozinho, quatro vezes, mas não obteve sucesso. Fuma, principalmente, à tarde e à noite, iniciando logo ao acordar. Sofreria mais se tivesse que deixar esse primeiro cigarro da manhã, pois é o que lhe dá mais satisfação. Tem dificuldade em não fumar em lugares proibidos, gerando desconforto com os filhos, pois não conseguiu cuidar da esposa, em longa internação hospitalar. Permaneceu fumando, mesmo doente e precisando ficar de cama quase um dia inteiro, como ocorrido há 30 dias, quando ficou resfriado.

De acordo com as informações fornecidas, qual é a pontuação do Sr. Antônio no teste de Fagerström?

- (A) 5.
- (B) 7.
- (C) 8.
- (D) 9.
- (E) 10.

**16.** Assinale a alternativa que apresenta os métodos de tratamento medicamentosos para cessação do tabagismo, preconizados como de primeira linha.

- (A) Terapia de reposição de nicotina, bupropiona e nortriptilina.
- (B) Bupropiona, vareniclina e clonidina.
- (C) Nortriptilina, clonidina e vareniclina.
- (D) Bupropiona, vareniclina e terapia de reposição de nicotina.
- (E) Terapia de reposição de nicotina, vareniclina e clonidina.

**17.** Homem, 35 anos, vem ao ambulatório com crise aguda de asma, clinicamente avaliada como leve/moderada. Foi realizada a administração repetida de  $\beta_2$  inalatório de ação curta, 4-5 jatos em 15 minutos (3 x). Quando reavaliado em menos de 1 hora, não houve melhora. Iniciam-se dose de corticoide via oral e  $\beta_2$  inalatório de ação curta, a cada 20 minutos por 1 hora, e oxigênio, com boa resposta, sendo liberado para o domicílio. Em relação às orientações e medicações na alta desse paciente, assinale a resposta **INCORRETA**.

- (A)  $\beta_2$  inalatório de ação curta ou nebulização, 2-5 jatos a cada 4 h por 48 h.
- (B) Corticoide VO por 3-7 dias.
- (C) Ajustar tratamento de base.
- (D) Revisão em 48-72 horas.
- (E) Anticolinérgico de curta duração.

**18.** Homem, 60 anos, trabalhador da construção civil, hipertenso em tratamento com clortalidona, consulta por dor intensa em olho esquerdo iniciada há 1 hora. Refere borramento visual e lacrimejamento. No exame físico, apresenta vermelhidão ocular, fotofobia e pupila com midríase irregular e não reagente a luz. Qual o diagnóstico mais provável?

- (A) Trauma corneano.
- (B) Uveíte anterior aguda.
- (C) Erosão de córnea.
- (D) Glaucoma agudo.
- (E) Descolamento de retina.

**19.** Considere as afirmações abaixo sobre parasitoses intestinais.

- I - Em áreas com precárias condições de moradia, higiene e saneamento básicos, há evidências de que o tratamento empírico regular das helmintíases traz benefícios em curto e longo prazos.
- II - Deve-se considerar a realização de exame parasitológico de fezes (EPF) entre 14 e 28 dias após o tratamento das teníases, para confirmação de cura.
- III- O tinidazol em dose única, o secnidazol em dose única e o metronidazol por 5 dias têm eficácia > 90% no tratamento da giardíase.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

**20.** Em relação à síncope, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- (A) A síncope neuromediada e a hipotensão ortostática são as causas mais comuns de síncope.
- (B) A abordagem diagnóstica visa estabelecer a etiologia, na maioria das vezes obtida por meio de uma boa história clínica e realização de exame físico.
- (C) As características de alto risco incluem história de doença estrutural cardíaca, ECG anormal e idade > 60 anos.
- (D) No que diz respeito à investigação complementar, um eletrocardiograma de repouso pode ser indicado em pacientes com síncope, se uma causa óbvia não for identificada por meio da história e exame físico.
- (E) Geralmente, os exames laboratoriais têm utilidade relevante no diagnóstico e no manejo dos episódios de síncope.

**21.** No contexto ambulatorial a causa mais frequente de dor torácica é:

- (A) cardíaca.
- (B) musculoesquelética.
- (C) pulmonar.
- (D) gastrintestinal.
- (E) psiquiátrica.

**22.** Em relação ao Diabetes tipo 2 é correto afirmar que

- (A) o alvo geral para a HbA1c é alcançar um valor  $\leq 6,5\%$  em todos os pacientes.
- (B) a neuropatia diabética é uma complicação menos comum, atingindo cerca de 10% dos casos ao longo da vida.
- (C) o hábito de fumar é o principal fator de risco para mortalidade por doença cardiovascular aterosclerótica.
- (D) o rastreamento da doença renal crônica deve ser realizado 6 meses após o diagnóstico.
- (E) a melhor opção farmacológica inicial para a maioria dos pacientes é a insulina.

**23.** Mulher, 38 anos, vem à consulta referindo quadro de diarreia aquosa há 5 dias, com 4 a 6 episódios/dia, sem sangue, muco ou pus, associado à dor abdominal difusa tipo cólica. Relata também que teve febre, mas não aferiu, além de 3 episódios de vômitos. Nega outros sinais e sintomas e refere que o marido está com o mesmo quadro. Em relação à doença diarreica aguda, assinale a afirmativa correta.

- (A) É caracterizada pela perda de grande quantidade de água durante as evacuações, em um período menor que 7 dias.
- (B) A solicitação de coprocultura deve ser realizada em todas as pessoas com doença diarreica aguda.
- (C) Usualmente é leve e autolimitada e causada por bactérias não invasivas e vírus, na maioria dos casos.
- (D) O uso rotineiro de antibióticos é recomendado para o tratamento da doença.
- (E) A hidratação endovenosa é o tratamento de primeira linha para os casos leves e moderados.

**24.** Assinale com **V** (verdadeiro) ou com **F** (falso) as seguintes afirmações a respeito da imunização de trabalhadores de serviços de saúde.

- ( ) A todo trabalhador dos serviços de saúde deve ser fornecido, gratuitamente, programa de imunização ativa contra tétano, difteria, hepatite B e os estabelecidos no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).
- ( ) O empregador deve assegurar que os trabalhadores sejam informados das vantagens e dos efeitos colaterais, assim como dos riscos a que estarão expostos por falta ou recusa de vacinação, devendo, nestes casos, guardar documento comprobatório e mantê-lo disponível à inspeção do trabalho.
- ( ) Sempre que houver vacinas eficazes contra outros agentes biológicos a que os trabalhadores estão, ou poderão estar, expostos, o empregador deve fornecê-las gratuitamente e obrigar os trabalhadores a se imunizar.
- ( ) O empregador deve fazer o controle da eficácia da vacinação sempre que for recomendado pelo Ministério da Saúde e seus órgãos, e providenciar, se necessário, seu reforço.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – F – V.
- (B) V – V – V – V.
- (C) V – F – F – V.
- (D) F – V – V – V.
- (E) V – V – V – F.

**25.** J.C.V., 24 anos, técnica de enfermagem de uma unidade de internação clínica, ao realizar curativo em um paciente que apresentava ferimento serossanguinolento (pessoa-fonte), sofreu respingo desse fluido nos olhos. O evento ocorreu logo no início do seu plantão noturno, e não estava utilizando equipamento de proteção ocular.

Assinale a alternativa que apresenta a conduta correta para este caso.

- (A) Não se deve condicionar o atendimento inicial da trabalhadora acidentada à identificação da pessoa-fonte.
- (B) O atendimento à trabalhadora deverá ocorrer ao final do seu plantão.
- (C) A orientação é realizar apenas a lavagem do olho atingido.
- (D) Como se trata de respingo em mucosa, não há necessidade de realizar o acompanhamento da acidentada, independente do status sorológico da pessoa-fonte.
- (E) Não é necessário revisar a imunização da trabalhadora para a hepatite B.