

CADERNO DE QUESTÕES



HOSPITAL DE
CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS

EDITAL N° 03/2022

DE PROCESSOS SELETIVOS (PS)

Cargo de Nível Médio

PS 19 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM (Cuidados Coronarianos)

	MATÉRIA	QUESTÕES	PONTUAÇÃO	
	Conhecimentos Específicos	01 a 25	0,40 cada	

ATENÇÃO

Transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTAS (Folha Óptica), com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

Os olhos são a janela da alma.

Nome do Candidato: _____

Inscrição n°: _____

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA FAURGS E DO HCPA.



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

EDITAL Nº 03/2022 DE PROCESSOS SELETIVOS

GABARITO APÓS RECURSOS

PROCESSO SELETIVO 19

TÉCNICO DE ENFERMAGEM (Cuidados Coronarianos)

01.	ANULADA	11.	D	21.	C
02.	D	12.	E	22.	A
03.	A	13.	D	23.	A
04.	E	14.	B	24.	D
05.	E	15.	C	25.	A
06.	B	16.	E		
07.	D	17.	D		
08.	C	18.	D		
09.	B	19.	C		
10.	B	20.	E		

INSTRUÇÕES

- 1 Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de **25** (vinte e cinco) questões objetivas.
- 3 Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 5 O candidato que comparecer para realizar a prova **não deverá, sob pena de ser excluído do certame**, portar armas, malas, livros, máquinas calculadoras, fones de ouvido, gravadores, *paggers*, *notebooks*, telefones celulares, *pen drives* ou quaisquer outros tipos de aparelhos eletrônicos, nem utilizar véus, bonés, chapéus, gorros, mantas, lenços, aparelhos auriculares, próteses auditivas, óculos escuros, ou qualquer outro adereço que lhes cubra a cabeça, o pescoço, os olhos, os ouvidos ou parte do rosto, **exceto em situações autorizadas pela Comissão do Concurso e/ou em situações determinadas em lei, como o uso recomendado de máscaras, em virtude da pandemia do Coronavírus. Os relógios de pulso serão permitidos, desde que permaneçam sobre a mesa, à vista dos fiscais, até a conclusão da prova.** (conforme subitem 7.10 do Edital de Abertura)
- 6 **É de inteira responsabilidade do candidato comparecer ao local de prova munido de caneta esferográfica, preferencialmente de tinta azul, de escrita grossa, para a adequada realização de sua Prova Escrita. Não será permitido o uso de lápis, marca-textos, régua, lapiseiras/grafites e/ou borrachas durante a realização da prova.** (conforme subitem 7.15.2 do Edital de Abertura)
- 7 Não será permitida nenhuma espécie de consulta em livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem o uso de instrumentos de cálculo ou outros instrumentos eletrônicos, exceto nos casos em que forem pré-estabelecidos no item 13 do Edital. (conforme subitem 7.15.3 do Edital de Abertura)
- 8 Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA a partir do número **26** serão desconsideradas.
- 9 Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 10 A duração da prova é de **duas horas e trinta minutos (2h30min)**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 11 **O candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora (1h) após o seu início. Se quiser levar o Caderno de Questões da Prova Escrita, o candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora e meia (1h30min) após o início. O candidato não poderá anotar/copiar o gabarito de suas respostas de prova.**
- 12 **Após concluir a prova e se retirar da sala, o candidato somente poderá utilizar os sanitários nas dependências do local de prova se for autorizado pela Coordenação do Prédio e se estiver acompanhado de um fiscal.** (conforme subitem 7.15.6 do Edital de Abertura)
- 13 Ao concluir a Prova Escrita, o candidato deverá devolver ao fiscal da sala a Folha de Respostas (Folha Óptica). Se assim não proceder, será excluído do Processo Seletivo. (conforme subitem 7.15.8 do Edital de Abertura)
- 14 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.

01. Sobre o código de ética profissional do servidor público, considere as afirmações abaixo.

- I - O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. A dignidade e integridade são princípios morais que devem nortear o exercício da função.
- II - O equilíbrio entre a legalidade e a remuneração do servidor público é a contrapartida para consolidar a moralidade do ato administrativo.
- III- É dever fundamental do servidor público, ter respeito à hierarquia e não resistir à pressão de contratantes que visem obter vantagens pessoais ou benesses.
- IV- A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor. Assim os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito funcional.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e IV.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas III e IV.
- (E) Apenas I, II e IV.

02. Um paciente internado na UTI Coronariana, em ventilação mecânica invasiva, apresentou uma parada cardiorrespiratória em ritmo chocável. A equipe assistencial realizou a reanimação imediatamente. Considere as diretrizes de RCR (Reanimação Cardiorrespiratória) e o caso acima, e assinale a alternativa correta.

- (A) Deve-se realizar 2 ventilações a cada 30 compressões torácicas até reanimação.
- (B) Deve-se preparar a carga de choque inicial para cardioversão, em modo sincronizado.
- (C) Deve-se administrar epinefrina, repetir a cada 2 minutos, conforme a orientação médica.
- (D) Deve-se ligar o cardiodesfibrilador bifásico, em 120J, para desfibrilação.
- (E) Não deve ser usado cardiodesfibrilador monofásico para reanimação em ritmo chocável.

03. Após a reanimação cardiorrespiratória, o profissional de saúde deve estar atento aos sinais de estabilização. Com relação a este tema, assinale a alternativa correta.

- (A) Deve-se manter a pressão arterial média acima de 65 mmHg.
- (B) Deve-se realizar eletrocardiograma de esforço para avaliação do ritmo cardíaco.
- (C) Deve-se avaliar o nível de consciência do paciente a cada 6 horas.
- (D) Deve-se oferecer água (via oral) para manter a hidratação.
- (E) Deve-se manter o paciente aquecido, com controle da temperatura corporal em 37°C.

04. É possível afirmar que a qualidade das compressões torácicas para RCR é garantida através

- (A) de compressão torácica mantendo um ritmo de 80 - 100 movimentos/minuto.
- (B) da não alteração do profissional que realiza a compressão torácica, a fim de manter a qualidade dos movimentos.
- (C) de compressão longitudinal com força média, a fim de evitar fraturas das costelas.
- (D) de hiperventilação para manter um nível alto de oxigênio.
- (E) de compressão torácica com força e rápida (120 movimentos/minuto), com mínimo de interrupções.

05. De acordo com a Norma Regulamentadora nº 32 (NR-32 - Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde), é correto afirmar que

- (A) o empregado poderá sair do local de trabalho com as vestimentas usadas nas atividades laborais, desde que tenha adquirido as mesmas.
- (B) é responsabilidade da equipe de enfermagem o descarte dos perfurocortantes utilizados nas áreas críticas.
- (C) os quimioterápicos podem ser preparados nas unidades de terapia intensiva, desde que no posto de enfermagem, com barreira estéril e dupla câmara.
- (D) o uso de luvas não estéreis substitui parcialmente o processo de lavagem das mãos.
- (E) o empregador deve vedar o ato de fumar, o manuseio de lentes de contato e o uso de adornos nos postos de trabalho.

06. Em relação aos cuidados com o local da punção após a cateterização cardíaca para coronariografia, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) deve-se avaliar o local de punção nas primeiras horas quanto à presença de sangramento e formação de hematoma.
- (B) deve-se manter o paciente com a cabeça elevada a 90°, se a punção arterial for via femoral.
- (C) deve-se avaliar os pulsos arteriais distais, o que é importante para identificar precocemente a ocorrência de trombose.
- (D) deve-se aplicar um saco de areia sobre o local da punção, se a punção for da artéria femoral.
- (E) em caso de dor no local da punção, administrar analgésicos via oral, conforme prescrição.

07. O infarto agudo do miocárdio (IAM) ocorre devido a uma isquemia miocárdica que pode levar à necrose dos tecidos, por isso a importância do diagnóstico e tratamento precoce. Com relação a esse tema, considere as afirmações abaixo.

- I - Paciente com diagnóstico de IAM, admitido na UTI Coronariana, deve ter como prioridades a monitorização dos sinais vitais e a testagem do acesso venoso.
- II - Se o paciente apresentar dor torácica, mas estiver monitorizado, a realização de um eletrocardiograma é desnecessária.
- III- É comum o paciente com IAM apresentar a pele fria e pegajosa, além de náuseas e vômitos, os quais podem estar associados com a dor no peito.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas I e III.
- (E) Apenas II e III.

08. Em relação à administração segura de medicamentos, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Deve-se verificar se a via de administração prescrita é a via tecnicamente recomendada para a administração do medicamento.
- (B) Deve-se registrar todas as ocorrências relacionadas aos medicamentos, tais como adiantamentos, cancelamentos, desabastecimento, recusa do paciente e eventos adversos.
- (C) Medicamentos de alta vigilância deverão ser prescritos com a dose, posologia e condições de uso, não sendo necessária a dupla checagem na administração dos mesmos.
- (D) Doses escritas com "zero", "vírgula" e "ponto" devem receber atenção redobrada, conferindo-se as dúvidas com o prescritor sobre a dose desejada, pois podem redundar em doses 10 ou 100 vezes superior à desejada.
- (E) Em paciente com depressão do nível de consciência, a equipe assistencial deverá conferir o nome do paciente descrito na prescrição com a pulseira de identificação.

09. De acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, considere os itens abaixo.

- I - Fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço, em benefício próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros.
- II - Retirar da repartição pública, sem estar legalmente autorizado, qualquer documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público.
- III- Facilitar a fiscalização de todos atos ou serviços por quem de direito.

Quais apresentam ações pertinentes ao servidor público?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

10. Um requisito essencial para a continuidade do cuidado e a segurança do paciente é a _____ entre os profissionais, pacientes e familiares. Enquanto os _____ se alternam, o paciente e a família são os mesmos. Nessa perspectiva, pacientes, familiares e equipe _____ a continuidade do cuidado.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do parágrafo acima.

- (A) interação – plantões – valorizam
- (B) comunicação – profissionais – asseguram
- (C) interação – turnos – fiscalizam
- (D) comunicação – turnos – ressaltam
- (E) interação – profissionais – valorizam

11. O edema agudo de pulmão é um indicador do agravamento da insuficiência cardíaca. Quanto ao cuidado de enfermagem, é correto afirmar que

- (A) deve-se manter o paciente com cabeceira reta e deve-se realizar monitorização da dor.
- (B) deve-se administrar rapidamente solução fisiológica, conforme a prescrição médica.
- (C) deve-se manter o paciente pronado nas primeiras 24 horas.
- (D) deve-se elevar a cabeceira, providenciar acesso venoso e manter cuidados com a oxigenação do paciente.
- (E) realizar passagem de sonda nasogástrica para decompressão abdominal.

12. Sobre os cuidados com o paciente e os profissionais que atuam na UTI, considere os itens abaixo.

- I - Preservação da identidade e da privacidade do paciente.
- II - Fornecimento de orientações aos familiares e aos pacientes sobre o estado de saúde.
- III- Ações de humanização da atenção à saúde e ambiência acolhedora.
- IV- Permissão de visitas diárias somente de familiares, por se tratar de área restrita e de alto risco para contaminação cruzada.

Quais apresentam cuidados que devem ser assegurados ao paciente por todos os profissionais da UTI?

- (A) Apenas I e IV.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas II e IV.
- (D) Apenas III e IV.
- (E) Apenas I, II e III.

13. Em relação à segurança do paciente, qual é a sequência correta dos cinco momentos para a higienização das mãos?

- (A) Antes do contato com o paciente – após a exposição de fluidos corporais – após áreas próximas do contato com o paciente – antes da realização do procedimento asséptico – após áreas próximas do contato com o paciente.
- (B) Antes da realização do procedimento asséptico – após áreas próximas do contato com o paciente – após a exposição de fluidos corporais – antes do contato com o paciente – após o contato com o paciente.
- (C) Após áreas próximas do contato com o paciente – antes do contato com o paciente – após a exposição de fluidos corporais – antes da realização do procedimento asséptico – após o contato com o paciente.
- (D) Antes do contato com o paciente – antes da realização do procedimento asséptico – após a exposição de fluidos corporais – após o contato com o paciente – após áreas próximas do contato com o paciente.
- (E) Após áreas próximas do contato com o paciente – após o contato com o paciente – após a exposição de fluidos corporais – antes da realização do procedimento asséptico – antes do contato com o paciente.

14. Sobre a lesão por pressão (LPP), considere os itens abaixo.

- I - Mobilização reduzida e doença vascular
- II - História prévia de LPP e desnutrição
- III- Fricção e deambulação
- IV- Uso prolongado de antibióticos
- V - Uso de colchão piramidal

Quais apresentam fatores de risco para o desenvolvimento da LPP?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas III e IV.
- (E) I, II, III, IV e V.

15. No eletrocardiograma (ECG), o posicionamento dos eletrodos é fundamental. Assinale a alternativa que apresenta os locais corretos dos eletrodos periféricos e pré-cordiais, respectivamente.

- (A) Tornozelos, tórax e braços.
- (B) Braços, tórax e tornozelos.
- (C) Punhos, tornozelos e tórax.
- (D) Tórax, punhos e ombros.
- (E) Punhos, ombros e tórax.

16. Assinale **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) nas afirmações abaixo quanto ao uso e à administração de medicamentos.

- () A etapa de administração é a primeira barreira para evitar um erro de medicação derivado dos processos de prescrição e dispensação, aumentando, com isso, a responsabilidade do profissional que administra os medicamentos.
- () A identificação do paciente na prescrição deverá incluir o nome completo, porém o nome abreviado pode ser utilizado na prática cotidiana dos estabelecimentos de saúde.
- () A reconstituição e diluição dos medicamentos é etapa que gera impacto sobre a estabilidade do medicamento, pois, em alguns casos, a incompatibilidade leva à diminuição ou à perda da ação farmacológica do medicamento.
- () As prescrições verbais devem ser restritas às situações de emergência, devendo ser imediatamente escritas no formulário da prescrição após a administração do medicamento.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – F – F – V.
- (B) V – V – V – F.
- (C) F – V – F – V.
- (D) V – F – V – F.
- (E) F – F – V – V.

17. Assinale a afirmação **INCORRETA** sobre a realização do exame ecocardiograma transesofágico.

- (A) As complicações na realização do exame referem-se a trauma na orofaringe, esôfago ou estômago.
- (B) Utiliza-se o ultrassom para visualização das estruturas cardíacas.
- (C) Os cuidados incluem a monitorização contínua, atenção às vias aéreas, oxigênio suplementar e sedação.
- (D) É dispensado o jejum de 8 horas.
- (E) A orofaringe é anestesiada, e a sedação é habitualmente de grau leve a moderado.

18. Em relação às doenças cardiovasculares, assinale a afirmação **INCORRETA**.

- (A) As descrições mais comuns de dor anginosa podem incluir sensação de peso no tórax, aperto, compressão, pressão, dor, queimação ou até indigestão.
- (B) O tratamento inicial para o infarto inclui alívio da dor, terapia com oxigênio e administração de AAS.
- (C) Insuficiência cardíaca congestiva é a incapacidade do coração de bombear sangue suficiente para satisfazer as necessidades de oxigenação e nutrição dos tecidos.
- (D) O choque cardiogênico resulta em um aumento da capacidade de o coração bombear o sangue.
- (E) Entre os fatores de risco para a doença cardiovascular estão: fumo, dislipidemia, diabetes melito, histórico familiar de doença cardiovascular em mulheres com menos de 65 anos ou homens com menos de 55 anos.

19. Assinale **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) para as atribuições do técnico de enfermagem.

- () Participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar.
- () Planejamento, organização, execução e avaliação dos serviços da assistência de enfermagem.
- () Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre assuntos de enfermagem.
- () Consulta de enfermagem e prescrição da assistência de enfermagem.
- () Participar da programação da assistência de enfermagem e executar ações assistenciais de enfermagem.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – F – V – V – F.
- (B) F – V – V – V – F.
- (C) V – F – F – F – V.
- (D) F – V – V – F – V.
- (E) V – V – F – F – V.

20. Os serviços de saúde devem manter um programa de educação permanente para os trabalhadores e para todos os envolvidos nas atividades de gerenciamento de resíduos. Com relação a esse assunto, considere os itens abaixo.

- I - Orientações quanto à higiene pessoal.
- II - Biossegurança.
- III- Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Coletiva (EPC).
- IV - Orientações especiais e treinamento em proteção radiológica quando houver rejeitos radioativos.

Quais apresentam temas que devem ser contemplados no programa de educação permanente acima mencionado?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas III e IV.
- (D) Apenas II, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

21. Qual é o gotejo (gotas por minutos) necessário para administrar 1.000 mL de soro glicosado a 5% em 6 horas?

- (A) 40 gotas/min.
- (B) 52 gotas/min.
- (C) 56 gotas/min.
- (D) 58 gotas/min.
- (E) 60 gotas/min.

22. Na prescrição: cefalexina 500mg suspensão, via oral de 6/6 horas. Considerando-se a apresentação em frasco contendo 250mg/5mL, qual o volume a ser administrado?

- (A) 10 mL.
- (B) 11 mL.
- (C) 15 mL.
- (D) 25 mL.
- (E) 50 mL.

23. Pacientes em estado grave, que necessitam de suporte à vida, recebem número expressivo de medicamentos. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando os medicamentos às suas respectivas características.

- (1) Amiodarona
- (2) Heparina
- (3) Nitroprussiato de sódio
- (4) Noradrenalina

- () A protamina reverte os seus efeitos.
- () Hipotensor de ação rápida.
- () Vasopressor.
- () Antiarrítmico.

- (A) 2 – 3 – 4 – 1.
- (B) 3 – 2 – 1 – 4.
- (C) 2 – 4 – 3 – 1.
- (D) 3 – 1 – 4 – 2.
- (E) 4 – 1 – 2 – 3.

24. Sobre o preparo e a administração de insulina para infusão contínua, considere os itens abaixo.

- I - Preparar a solução de insulina com técnicas que minimizem a adsorção: utilizar frasco de polipropileno e equipo curto, evitar o preparo com antecedência maior de 15 minutos antes do início da infusão.
- II - Instalar e controlar rigorosamente a solução contínua em bomba de infusão.
- III- Pausar a infusão na falta de aporte calórico. Realizar controle glicêmico a cada 1 ou 2 horas.

Quais estão corretos?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

25. Pacientes podem apresentar algum grau de dor, sendo necessário que essa dor seja aliviada. A esse respeito, assinale as afirmações abaixo com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso).

- () Entre os opioides, a morfina é considerada o padrão-ouro e pode ser administrada por diversas vias.
- () O tramadol é considerado um opioide fraco e pode ser administrado na dor com intensidade 6.
- () Deve-se utilizar escalas de mensuração da intensidade da dor.
- () A avaliação da dor deve ser sistemática e regular em pacientes com cuidados intensivos, utilizando-se a escala apropriada para cada caso.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V – V – V – V.
- (B) V – V – F – F.
- (C) V – F – V – F.
- (D) F – V – F – V.
- (E) F – F – V – V.