



EDITAL Nº 01/2020
DE PROCESSOS SELETIVOS (PS)

MISSÃO

Ser um referencial público em saúde, prestando assistência de excelência, gerando conhecimento, formando e agregando pessoas de alta qualificação.

PS 15 - ENFERMEIRO I
(Saúde Mental)

| MATÉRIA | QUESTÕES | PONTUAÇÃO |
|---------------------------|----------|-----------|
| Conhecimentos Específicos | 01 a 25 | 0,40 cada |



DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA FAURGS E DO HCPA.

Nome do Candidato: _____

Inscrição nº: _____



FAURGS
Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

INSTRUÇÕES

- 1 Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde ao Processo Seletivo para o qual você está inscrito. Caso não corresponda, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 2 Esta PROVA consta de **25** (vinte e cinco) questões objetivas.
- 3 Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala que o substitua.
- 4 Para cada questão objetiva, existe apenas **uma** (1) alternativa correta, a qual deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS.
- 5 Os candidatos que comparecerem para realizar a prova **não deverão portar** armas, malas, livros, máquinas calculadoras, fones de ouvido, gravadores, *paggers*, *notebooks*, **telefones celulares**, *pen drives* ou quaisquer aparelhos eletrônicos similares, nem utilizar véus, bonés, chapéus, gorros, mantas, lenços, aparelhos auriculares, próteses auditivas, óculos escuros, ou qualquer outro adereço que lhes cubra a cabeça, o pescoço, os olhos, os ouvidos ou parte do rosto, sob pena de serem excluídos do certame. **Os relógios de pulso serão permitidos, desde que permaneçam sobre a mesa, à vista dos fiscais, até a conclusão da prova.** (conforme subitem 7.10 do Edital de Abertura)
- 6 **É de inteira responsabilidade do candidato comparecer ao local de prova munido de caneta esferográfica, preferencialmente de tinta azul, de escrita grossa, para a adequada realização de sua Prova Escrita. Não será permitido o uso de lápis, marca-textos, régua, lapiseiras/grafites e/ou borrachas durante a realização da prova.** (conforme subitem 7.15.2 do Edital de Abertura)
- 7 Não será permitida nenhuma espécie de consulta em livros, códigos, revistas, folhetos ou anotações, nem o uso de instrumentos de cálculo ou outros instrumentos eletrônicos, exceto nos casos em que forem pré-estabelecidos no item 13 do Edital. (conforme subitem 7.15.3 do Edital de Abertura)
- 8 Preencha com cuidado a FOLHA DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Eventuais marcas feitas nessa FOLHA a partir do número **26** serão desconsideradas.
- 9 Ao terminar a prova, entregue a FOLHA DE RESPOSTAS ao Fiscal da sala.
- 10 A duração da prova é de **duas horas e trinta minutos (2h30min)**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. Ao final desse prazo, a FOLHA DE RESPOSTAS será **imediatamente** recolhida.
- 11 **O candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora (1h) após o seu início. Se quiser levar o Caderno de Questões da Prova Escrita, o candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora e meia (1h30min) após o início. O candidato não poderá anotar/copiar o gabarito de suas respostas de prova.**
- 12 **Após concluir a prova e se retirar da sala, o candidato somente poderá se utilizar de sanitários nas dependências do local de prova se for autorizado pela Coordenação do Prédio e se estiver acompanhado de um fiscal.** (conforme subitem 7.15.6 do Edital de Abertura)
- 13 Ao concluir a Prova Escrita, o candidato deverá devolver ao fiscal da sala a Folha de Respostas (Folha Óptica). Se assim não proceder, será excluído do Processo Seletivo. (conforme subitem 7.15.8 do Edital de Abertura)
- 14 A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar a anulação da prova do candidato.



01. O mundo contemporâneo é cada vez mais dependente da ação humana. Eliane Brum, em seu texto "Antiautoajuda em 2015", diz que, se não quisermos alcançar um ponto de "não retorno", é preciso deixar de viver no "modo avião", que nos desliga da realidade. Há um mal-estar, segundo a autora. Esse mal-estar produz um sintoma social. E esse sintoma social produz uma psiquiatrização das pessoas.

Sobre o fenômeno da psiquiatrização no Brasil, é correto afirmar que

- (A) entrou em declínio com a incorporação dos Institutos de Aposentadorias e Pensões e o surgimento do Instituto Nacional de Previdência Social na década de 1960.
- (B) se acentuou com o surgimento dos primeiros neurolépticos, em meados de 1950, com o intuito de tornar a internação mais tolerável e seus doentes mais dóceis.
- (C) teve, na eugenia, sua concepção modelar, baseada na ideia de que é preciso respeitar a diversidade de opiniões, etnias e subjetividades humanas.
- (D) foi desconstruída na medida em que avançavam as discussões sobre a necessidade de desospitalizar os doentes mentais.
- (E) a parceria do setor privado com o setor público, no Brasil, contribuiu para que as experiências reformadoras se consolidassem e não adquirissem um caráter de marginalidade.

02. A Revista Veja, em reportagem de 05 de junho de 2019, citou o Relatório da Organização Mundial da Saúde, de 2018, sobre as Consequências das Doenças Mentais na Região das Américas, em que o Brasil recebeu o título de "país mais ansioso do mundo". Críticos à excessiva psiquiatrização e medicalização da vida, como o historiador Leandro Karnal e a psicóloga Rosely Sayão, destacam a "epidemia de diagnósticos", que supervaloriza o sintoma e apaga a pessoa que está por trás dele.

Franco Basaglia (2005) considera que o fenômeno da psiquiatrização não foi interrompido com o movimento da desinstitucionalização, mas que foram introduzidas algumas adaptações nos dispositivos assistenciais. Para o autor, o objetivo prioritário, nessa transformação institucional, é

- (A) reformar o espaço manicomial para resgatar a identidade do sujeito.
- (B) reintroduzir a pessoa no mundo formal do trabalho.
- (C) suavizar a dependência pessoal do sujeito à organização médica e à lei.
- (D) substituir a relação de tutela pela relação de contrato.
- (E) construir uma nova carreira moral do doente mental.

03. A preocupação excessiva com o controle do peso e com a imagem corporal pode ser sinal de anorexia nervosa ou bulimia nervosa, ambas envolvendo padrões anormais de ingestão de alimentos. A ideia de que os transtornos da alimentação resultam de pressão cultural para ser magro é simplista demais; fatores biológicos, incluindo fatores genéticos, desempenham um papel igualmente importante.

Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando os transtornos alimentares aos respectivos sintomas.

- (1) Anorexia
- (2) Bulimia
- () Comportamento perfeccionista
- () Depressão
- () Abuso de laxantes, diuréticos ou enemas para evitar ganho de peso
- () Confusão ou pensamento lento
- () Pele manchada ou amarelada

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 2 – 1 – 2 – 1 – 1.
- (B) 1 – 1 – 2 – 2 – 1.
- (C) 1 – 2 – 1 – 1 – 2.
- (D) 2 – 2 – 1 – 1 – 1.
- (E) 1 – 1 – 1 – 2 – 2.

04. A esquizofrenia se manifesta por meio de distúrbios nos processos de pensamento, percepção e afeto, que, invariavelmente, resultam em uma deterioração grave do funcionamento social e ocupacional do paciente. Considere, abaixo, as afirmações sobre os tipos de esquizofrenia e suas características.

- I - A esquizofrenia catatônica pode se manifestar por estupor ou excitação.
- II - No transtorno esquizoafetivo, o prognóstico geralmente é melhor do que para outros transtornos esquizofrênicos, mas pior do que para transtornos de humor isolados.
- III- A esquizofrenia desorganizada apresenta início tardio dos sintomas, geralmente após os 25 anos, sendo a aparência pessoal, geralmente, negligenciada e o comprometimento social extremo.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas II.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

05. F.A.E, 39 anos, procedente do interior do Estado, solteiro, usuário de drogas, mora com o pai, com o qual não mantém boa relação. Chega ao hospital com diminuição do sono, hostilidade, alucinações auditivas com vozes de comando, pensamento delirante e comportamento hipersexualizado e desorganizado. Presença de alguns rituais de conferência e discurso desconexo. Após alguns dias internado, entra em protocolo de uso de Clozapina. Sobre o uso de Clozapina no tratamento de transtornos mentais, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) tem atividade anticolinérgica e antisserotonérgica.
- (B) tem visível superioridade em sintomas positivos e negativos da esquizofrenia.
- (C) não é indicada em pacientes esquizofrênicos com discinesia tardia.
- (D) hipersalivação, convulsões e *delirium* são sintomas sugestivos de intoxicação.
- (E) exames laboratoriais devem ser feitos semanalmente para medir os níveis séricos e afastar complicações, como agranulocitose.

06. O sofrimento social é um conceito que, conforme Antonio Nery Filho e Patrícia Von Flach (2017), em seu texto "Os sujeitos da exclusão: das práticas de cuidado à iatrogenia dos Movimentos de Resistência", indica as relações existentes entre o mal-estar subjetivo e determinados processos históricos mais complexos. Arelado ao desenvolvimento de relações desiguais de poder, historicamente e discursivamente produzidas, materializa-se no campo social em estruturas de violência, repletas de estigmas, preconceitos e desigualdades de oportunidades.

No campo das drogas, as desastrosas políticas proibicionistas expuseram o lado mais perverso desse contexto. Para o enfermeiro, é mais importante, enquanto membro de uma equipe de saúde, reconhecer a relação que o usuário estabelece com a droga do que priorizar a droga em si.

Assinale a alternativa que **NÃO** reflete o posicionamento dos autores em relação ao fenômeno das drogas.

- (A) O desafio do trabalhador é se encontrar na linha tênue entre trabalhar para manter o modelo hegemônico biomédico e operar mudanças no modo de produzir cuidado.
- (B) A itinerância é a única marca das equipes de saúde que trabalham com usuários de substâncias psicoativas no contexto da rua.
- (C) A população de usuários de crack, moradores de rua, se torna visível à sociedade por conta das sucessivas medidas de violências e situações de humilhação social a que está submetida.
- (D) Vivemos a coexistência de práticas de cuidado pautadas no respeito aos valores humanos, ao lado de práticas repressoras e moralizantes.
- (E) A singularização também é uma experiência de resistência no campo da saúde, de oposição a discursos hegemônicos.

07. Segundo dados do Boletim de Vigilância Epidemiológica do Estado do Rio Grande do Sul (2018), o Estado lidera as maiores taxas de suicídio do Brasil. Em 2016, por exemplo, aconteceram 11 suicídios para cada 100.000 habitantes, quase o dobro da média brasileira. Por ser um fenômeno complexo e multifatorial, requer ações estratégicas articuladas de modo interdisciplinar e intersetorial.

A Agenda de Ações Estratégicas para Vigilância e Prevenção do Suicídio e Promoção da Saúde no Brasil (2017-2020) é um caderno contendo três eixos de atuação. De acordo com esta Agenda, assinale a alternativa que apresenta ação estratégica de Gestão e Cuidado.

- (A) Fomentar a qualificação e melhoria da efetividade da regulamentação da publicidade e disponibilidade de bebidas alcoólicas.
- (B) Sensibilizar e capacitar lideranças comunitárias, especialmente aquelas que trabalham com populações ou grupos em situação de maior vulnerabilidade.
- (C) Elaborar materiais instrutivos para sensibilizar e capacitar profissionais de saúde, para qualificação dos registros de notificações, relacionadas ao suicídio.
- (D) Articular com o CVV a expansão nacional do código gratuito 188, de modo a permitir o acompanhamento da problemática, em nível local, na Rede de Atenção à Saúde.
- (E) Articular com Secretarias de Segurança Pública e Instituto Médico Legal estratégias estruturantes para melhoria do diagnóstico e registro da causa de morte por suicídio.

08. Os seguintes estados mentais estão relacionados ao risco de suicídio, **EXCETO**:

- (A) constrição cognitiva.
- (B) sentimentos de desesperança.
- (C) ansiedade.
- (D) prática religiosa.
- (E) impulsividade.

09. Considere as afirmações abaixo com relação aos transtornos de personalidade.

- I - Portadores de transtornos de personalidade esquizoide apresentam profundo distanciamento das relações sociais.
- II - Cisão é um mecanismo de defesa do ego primitivo comum em pessoas com transtorno de personalidade narcisista.
- III- Indivíduos com transtorno de personalidade antisocial se veem como vítimas, usando a projeção como mecanismo de defesa primário do ego.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas II.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas I e III.
- (E) Apenas II e III.

10. Enfermeiros que trabalham com famílias convivem, constantemente, com a necessidade de realizar escuta atenta e serem úteis, de forma a proporcionar ambientes acolhedores e sensíveis ao sofrimento. Entretanto, erros são comuns na prática profissional de enfermagem, podendo causar impacto importante no relacionamento com o grupo familiar. Nesse sentido, considere os itens abaixo.

- I - Tomar partidos.
- II - Fazer muitos aconselhamentos de maneira prematura.
- III- Falhar na criação de um contexto para a mudança.

Quais os principais erros cometidos por enfermeiros que trabalham com famílias?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

11. A Síndrome Neuroléptica Maligna (SNM) é uma reação extremamente grave ao uso de antipsicóticos. Seu diagnóstico é basicamente clínico, embora alguns marcadores laboratoriais também estejam presentes. É potencialmente fatal em 20 a 30% dos casos. Sobre essa síndrome, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) deve ser tratada preferencialmente em Unidades de Terapia Intensiva, por ser um quadro grave.
- (B) o uso de neurolépticos de alta potência pode ter relação com o desenvolvimento da SNM.
- (C) febre e instabilidade autonômica estão presentes entre suas manifestações clínicas.
- (D) a Clozapina é uma opção farmacológica para pacientes que desenvolveram SNM e que ainda precisam de antipsicótico.
- (E) ocorre com a mesma frequência em homens e mulheres.

12. A inflação de diagnósticos psiquiátricos, na sociedade moderna, traduz um processo no qual a vida se tornou uma patologia. Um exemplo é a dor da perda de alguém: elaborá-la? Só até duas semanas. Após isso, independentemente do tempo de cada um para isso, a dor é calada por medicamentos. É o que a jornalista Eliane Brum, em sua matéria "Acordei doente mental" (2013), defende. Para ela:

"Só se pode compreender as escolhas de alguém a partir do sentido que as pessoas dão às suas escolhas [...] Só teria acordado [doente mental] se permitisse a uma Bíblia – e a pastores de jaleco – determinar os sentidos que construo para a minha vida" (Eliane Brum).

Franco Basaglia (2005) dizia que a psiquiatria sempre colocou o homem "entre parênteses" e supervalorizou a doença. Nesse sentido, só será possível avançar para um contexto de efetiva desinstitucionalização, quando se

- (A) reconhecer a incapacidade da psiquiatria em fornecer conhecimento satisfatório para o problema concreto da internação e da loucura.
- (B) identificar os pontos frágeis dos manuais diagnósticos, promovendo seu refinamento, com base nas evidências científicas disponíveis.
- (C) valorizar determinados conhecimentos desenvolvidos nas instituições manicomiais, adaptando-os ao contexto das práticas territoriais.
- (D) trabalhar com os conceitos de saúde e doença de maneira isolada, para maior compreensão do cotidiano.
- (E) reconsiderar a relação estabelecida entre os técnicos e os pacientes dentro dos espaços do hospital psiquiátrico.

13. São intervenções de enfermagem, no plano de cuidados para crianças com Transtorno do Espectro Autista, **EXCETO**:

- (A) trabalhar com a criança coletivamente.
- (B) manter consistência com relação aos cuidadores.
- (C) oferecer reforço positivo quando for utilizado contato visual para conduzir expressões não verbais.
- (D) ajudar a criança a reconhecer partes separadas do corpo durante as atividades de autocuidado.
- (E) buscar esclarecimento e validação das informações.

14. Qual dos fatores descritos abaixo **NÃO** corresponde ao diagnóstico de enfermagem "Automutilação", conforme a classificação da *North American Nursing Diagnosis Association* (Edição 2018-2020)?

- (A) Comportamento instável.
- (B) Dissociação.
- (C) Ausência de confidente na família.
- (D) Comunicação eficaz entre pais.
- (E) Perfeccionismo.

15. Liderança é um conceito que permeia diferentes áreas do conhecimento. Na prática clínica, em especial no campo grupal, o líder tem um papel muito importante. Ele pode ser designado a assumir essa função ou naturalmente nasce entre os membros do grupo. Considere as afirmações abaixo em relação aos conceitos de liderança, segundo Enrique Pichon Rivière (apud ZIMERMAN, 2000).

- I - A liderança autocrática habitualmente é exercida por pessoas com características negligenciais. Seu maior risco é a não conformação de um espaço continente para as angústias e limites do grupo.
- II - A liderança democrática possui um componente de liberalidade associado com a definição de limites hierárquicos, mais flexíveis e questionáveis pelos integrantes.
- III- A liderança demagógica é aquela em que o líder reúne um discurso consistente, mas com pouca repercussão em ações reais.
- IV - A liderança do tipo *laissez-faire* é comumente exercida por pessoas com características narcisistas, sendo própria de grupos compostos por pessoas inseguras de sua função social e que não sabem fazer uso racional da sua liberdade.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas III.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas III e IV.
- (D) Apenas I, II e III.
- (E) Apenas I, III e IV.

16. Segundo a Portaria GM/MS nº 3.588/2017, que estabelece novos parâmetros estruturantes da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), os Centros de Atenção Psicossocial de Álcool e outras Drogas (tipo IV) têm como diretriz

- (A) adequar a oferta de serviços às necessidades do usuário, recorrendo às tecnologias de baixa exigência.
- (B) atender crianças e adolescentes separadamente.
- (C) operar na lógica de um processo de trabalho, priorizando os espaços individuais de atendimento.
- (D) concentrar a responsabilidade pelos usuários nas internações e em outros pontos de atenção.
- (E) funcionar de forma não necessariamente articulada com a Rede do Sistema Único de Assistência Social, coordenando o Projeto Terapêutico Singular.

17. A ansiedade é uma reação emocional normal e esperada diante de situações novas e desconhecidas. É possível distinguir a ansiedade patológica da ansiedade normal em resposta ao estresse, por meio de quatro critérios, **EXCETO**:

- (A) autonomia.
- (B) situação.
- (C) intensidade.
- (D) duração.
- (E) comportamento.

18. Sobre o *delirium*, assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo.

- () Caracteriza-se por estreitamento da consciência, prejuízo na atenção, alterações cognitivas e senso-perceptivas.
- () É frequentemente iatrogênico, resultando de problemas com medicações, estresse secundário a cirurgias ou complicações de procedimentos.
- () A ampla gama de sintomas neuropsiquiátricos se manifesta a partir da disfunção generalizada de funções corticais superiores.
- () Pacientes vítimas de trauma têm chances menores de desenvolver *delirium* por estarem mais amplamente assistidos durante a hospitalização.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F – F – V – F.
- (B) V – V – V – F.
- (C) F – V – F – V.
- (D) V – V – F – V.
- (E) V – F – V – V.

19. O transtorno bipolar é caracterizado por alterações de humor que vão de um estado de depressão profunda a uma euforia extrema (mania), intercalados por períodos de normalidade. Durante o episódio maníaco, o humor se mostra elevado, expansivo ou irritável, podendo estar presentes características psicóticas. Considerando o plano de cuidados para o indivíduo em episódio maníaco, no âmbito da interação social prejudicada, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) o indivíduo deve receber limites quando o comportamento se mostra manipulativo.
- (B) se deve evitar argumentar, barganhar ou discutir as reações relacionadas a comportamentos inadequados com o indivíduo.
- (C) à medida que a autoestima diminui, o indivíduo sentirá menos necessidade de manipular os outros para sua própria gratificação.
- (D) é importante fornecer reforço positivo para comportamentos não manipulativos.
- (E) tentar compreender a motivação por trás da manipulação pode facilitar a aceitação do indivíduo e de seu comportamento.

20. Considere os itens abaixo em relação a condições associadas ao domínio "segurança/proteção", segundo a classificação da *North American Nursing Diagnosis Association* (Edição 2018-2020).

- I - Déficit proprioceptivo
- II - Período de recuperação pós-operatório
- III- Alteração da função cognitiva

Quais condições associadas correspondem ao diagnóstico de enfermagem "Risco de Quedas"?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

21. Considere o fenômeno da resistência no grupo. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando os papéis assumidos à respectiva definição conceitual.

- (1) Sabotador
- (2) Silencioso
- (3) Ambíguo
- (4) Desviador de assuntos

- () "Capta" o risco de certos aspectos ansiogênicos e dá um jeito de mudar para assuntos mais amenos.
- () Possui contradições em seus núcleos de identidade, maneja seus problemas com características psicopáticas e pode funcionar como um pseudocolaborador.
- () Comporta-se à moda de um líder negativo, tentando impedir que o grupo cresça; revela-se como pseudocolaborador e prefere as pseudoadaptações.
- () Apresenta-se de distintas formas, que lhe servem de proteção contra o acesso a sentimentos que não quer ou não pode mexer.

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 3 – 2 – 1 – 4.
- (B) 4 – 3 – 1 – 2.
- (C) 3 – 2 – 4 – 1.
- (D) 4 – 1 – 2 – 3.
- (E) 1 – 2 – 3 – 4.

22. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando os fármacos e seus achados clínicos à intoxicação/reações adversas.

- (1) Opioides
- (2) Benzodiazepínicos
- (3) Neurolépticos
- (4) Anfetaminas
- (5) Tricíclicos

- () Agitação, alucinações, taquicardia, pele seca, midríase, rubor.
- () Depressão do SNC, bradipneia, hipotensão, hipotermia.
- () Depressão do SNC e respiratória, miose, edema pulmonar.
- () Hipotensão, distonia, ataxia, crises oculogíricas, trismo.
- () Hipertensão, taquicardia, arritmias, paranoia, midríase.

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é

- (A) 3 – 2 – 4 – 5 – 1.
- (B) 1 – 2 – 3 – 5 – 4.
- (C) 2 – 3 – 5 – 4 – 1.
- (D) 4 – 5 – 2 – 3 – 1.
- (E) 5 – 2 – 1 – 3 – 4.

23. A depressão aparece em segundo lugar entre as doenças mais incapacitantes que atingem indivíduos em idade produtiva. No hospital geral, de 1 a 2/3 dos pacientes deprimidos não são detectados e tratados de forma adequada. Isso ocorre, pelo menos em parte, porque a equipe assistencial foca seu trabalho no tratamento das condições físicas agudas. A depressão faz a tonalidade do humor saltar para irritabilidade. Essa combinação de humor depressivo e irritabilidade é chamada de

- (A) anedonia.
- (B) disforia.
- (C) tristeza.
- (D) avolia.
- (E) labilidade.

24. Os sintomas obsessivo-compulsivos são encontrados nos mais variados perfis de pacientes. Considerando a entrevista com o paciente obsessivo-compulsivo, pode-se afirmar que o principal problema para o enfermeiro é

- (A) estabelecer o contato emocional genuíno.
- (B) interpretar todas as manobras de defesas utilizadas.
- (C) exigir do paciente uma tomada de decisão.
- (D) utilizar formas estereotipadas de iniciar e terminar a entrevista.
- (E) parecer indiferente, distante e objetivo.

25. A revista *Veja*, de 02/09/2019, divulgou parte de um estudo internacional que coloca o *bullying* como uma prática de intimidação que afeta diretamente a saúde mental de crianças e adolescentes. Entre os resultados do estudo, vítimas de *bullying* passaram a não frequentar regularmente as aulas, outras desenvolveram transtornos de ansiedade e, inclusive, tentativas de suicídio. Para o enfermeiro de saúde mental, é fundamental lidar com o *bullying*, conhecendo sua dinâmica e os atores envolvidos.

Em relação ao *bullying*, assinale a afirmação correta.

- (A) Corresponde a uma forma de intimidação dirigida, de maneira esporádica, a um alvo específico, mais fraco e indefeso (vítima).
- (B) Geralmente inicia na adolescência, podendo trazer repercussões negativas ao funcionamento psíquico do indivíduo adulto.
- (C) Formas de *bullying*, como a intimidação emocional, afetam menos a atmosfera escolar do que as interações entre os membros da família.
- (D) A intimidação pode refletir uma tendência genética à agressividade, de maneira mais isolada que outros componentes socioambientais.
- (E) Formas de intimidação virtual (*cyberbullying*), com postagem de conteúdos negativos ou fotos depreciativas das vítimas, têm sido uma tendência atual.

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

EDITAL Nº 01/2020 DE PROCESSOS SELETIVOS

GABARITO APÓS RECURSOS

PROCESSO SELETIVO 15

ENFERMEIRO I (Saúde Mental)

| | | | | | |
|-----|----------|-----|----------|-----|----------|
| 01. | B | 11. | E | 21. | B |
| 02. | D | 12. | A | 22. | E |
| 03. | A | 13. | A | 23. | B |
| 04. | B | 14. | D | 24. | A |
| 05. | C | 15. | A | 25. | E |
| 06. | B | 16. | A | | |
| 07. | D | 17. | B | | |
| 08. | D | 18. | B | | |
| 09. | D | 19. | C | | |
| 10. | E | 20. | E | | |